


**TERCIARIO (Mioceno)**

Estado Falcón

Referencia original: H. H. Renz, 1948, p. 45-46.

Renz (1948) designó con este nombre a las zonas combinadas de *Robulus wallacei* y *Siphogenerina transversa* establecidas por él, con sección tipo en Mene de Acosta, Falcón oriental. El nombre se deriva del Distrito Acosta, y la sección tipo comprende partes de las formaciones San Lorenzo y Pozón del Grupo Agua Salada.

El espesor del piso en la sección tipo es de 171 metros, que abarcan 116 metros del Miembro de Arcillas de Menecito (Formación San Lorenzo), 10 metros del Miembro de Arcillas Glauconíferas de Policarpio (Formación Pozón) y 45 metros del Miembro de Arcillas Margosas de Husito. En Pozón el espesor probablemente sobrepasa los 500 metros y en las zonas costaneras de Isidro-Agüide puede alcanzar 2.000 metros. Los sedimentos del piso son concordantes con los de la Zona de "*Uvigerinella*" *sparsicostata*, infrayacente, y los del Piso Araguatiense, suprayacente. Según Renz la base se distingue por la aparición de numerosas especies nuevas y el tope coincide con la desaparición de *Siphogenerina transversa*. Renz correlacionó el piso con las zonas media y superior de la Formación Carapita en Venezuela, con faunas de la región del Caribe y el Piso Saucesiense y parte del Zemorriense inferior de California y lo atribuyó al Oligoceno en su totalidad.

Petters y Sarmiento (1956) correlacionaron las zonas del piso con zonas establecidas por ellos en la sección terciaria entre El Carmen y Zambrano, Colombia; Becker y Dusenbury (1958) correlacionaron los foraminíferos del Terciario de La Goajira con las zonas de *Robulus wallacei* y *Siphogenerina transversa* sin diferenciar. Según Blow (1956) el Acostiense corresponde en orden ascendente, a parte de la Zona de *Catapsydrax stainforthi*, la Zona de *Globigerinatella insueta* s. lat., la Zona de *Globigerina fohsi barisanensis* y parte de la Zona de *G. fohsi fohsi*. De acuerdo con las investigaciones mas recientes (Cati *et al.*, 1968), estas zonas corresponden al Mioceno inferior y medio.

Véanse [**ROBULUS WALLACEI, Zona de; SIPHOGENERINA TRANSVERSA, Zona de; AGUA SALADA, Grupo.**](#)

Referencias

Becker, L. E. y Dusenbury Jr., A. N., 1958. Mio-Oligocene (Aquitanian) foraminifera from the Goajira Península, Colombia. *Cushman Found. Foram. Res.*, Sp. Publ. N° 4, 48 pp.

Blow, W. H., 1956. Origin and evolution of the foraminiferal genus *ORBULINA* d'Orbigny. *Micropaleontology*, 2(1): 57-70.

Cati, F., M. L. Calalong, U. Crescenti, S. D'Onofrio, U. Follador, C. Pirini Raddrizzani, A. Pomesano Cherchi, G. Salvarorini, S. Sartoni, I. Premoli Silva, C. F. Wezel, V. Bertolino, G. Bizon, H. M. Bolli, A. M. Borsetti Cat, L. Dondi, H. Feinberg, D. G. Jenkins, E. Perconing, M. Sampo y R. Spovieri, 1968. Biostratigrafía del Neogeno mediterraneo basata sui foraminiferi planctonici. *Soc. Geol. Italiana.*, Boll., 87: 491-503.

Petters, V. y S. R. Sarmiento, 1956. Oligocene and Lower Miocene biostratigraphy of the El Carmen-Zambrano Area, Colombia. *Micropaleontology*, 2(1): 7-34.

Renz, H. H., 1948. Stratigraphy and fauna of the Agua Salada Group, State of Falcón, Venezuela, *Geol. Soc. Amer.*, Mem., 32, 219 p.



1st Ed. English



Comentarios Recibidos



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)