

PRECAMBRICO

Estado Bolívar

Referencia original: S. E. Aguerrevere, V. M. López, C. Delgado y C. A. Freeman, 1939, p. 685.

Consideraciones históricas: Aguerrevere, S. E. *et al.*, (1939) describieron con este nombre a "dos lechos superpuestos con estructura casi horizontal, de material volcánico muy cementado y muy endurecido", que encuentran cerca del pueblo de Arabopó, estado Bolívar. Esta unidad presenta un lecho inferior constituido por un jaspe verde muy denso que representa cenizas volcánicas muy silicificadas y un lecho superior, formado por una toba volcánica silicificada, mucho más granular y de color gris claro. Reid (1972), incluye el lecho inferior dentro de la Formación Cuquenán del Grupo Roraima. Ghosh (1977), en su estudio del Grupo Roraima, en las regiones de Cerro Sipapo y Cerro Parú en el estado Amazonas, señaló la presencia de rocas similares dentro de ese Grupo.

© M. E. M., 26 de Noviembre de 1997

Referencias

Aguerrevere, S. E.; V. M. López; C. Delgado and C. A. Freeman, 1939. Exploración de la Gran Sabana, *Rev. de Fomento* (Venezuela), año 3, (19): 501-729.

Ghosh, S. K., 1977. Geología del Grupo Roraima en el Territorio Federal Amazonas, Mem., *V Cong. Geol. Venez.*, 1: 167-193.

Reid, A. R., 1974. Stratigraphy of the type area of the Roraima Group, Venezuela. *IX Conf. Geol. Inter. Guayanas*, Ciudad Guayana. Venezuela. 1972. Memoria, *Bol. Geol.*, Caracas, Pub. Espec. N° 6, p. 343-353.

Enviar Comentarios



2a Edición LEV



Comentarios Recibidos



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)