




TERCIARIO (Mioceno Medio?-Tardío?)

Estado Miranda

Referencia original: A. N. Dusenbury y P. P. Wolcott, 1950, p. 22.

Consideraciones históricas: Este nombre fue publicado originalmente sin descripción por Dusenbury y Wolcott (1950), y figuró en el cuadro de correlación de Mencher *et al.* (1951). Bucher (1952) describió la unidad muy someramente. Dusenbury (1956, *Léxico Estratigráfico de Venezuela*) suministró una descripción más amplia a base de informes inéditos. Feo-Codecido (1962) resumió estos datos y mostró los afloramientos de la Formación Aramina y unidades vecinas en un mapa de Venezuela norte-central. Bermúdez (1966) añadió datos sobre la microfauna, y atribuyó la unidad al Mioceno superior, en contraste con la edad previamente postulada de Mioceno medio; además separó de la formación, con el nombre de Formación Carenero, a los estratos expuestos cerca del pueblo del mismo nombre.

Localidad tipo: Quebrada Aramina, tributaria norte del río Tuy, que atraviesa la carretera Caucagua-Capaya, 7 kilómetros al suroeste de Capaya, Estado Miranda. La sección tipo se extiende desde las rocas metamórficas al oeste "...hasta un punto que se encuentra aguas abajo, a un kilómetro más allá de Los Fernández. . .".

Descripción litológica: Dusenbury mencionó 30 a 50 metros de conglomerados basales que incluyen algunas capes de calizas impuras con fragmentos angulares de esquistos, seguidos de lutitas arcillosas de color gris verdoso, arcillas, y areniscas, con escasas calizas limosas intercaladas en la parte inferior.

Espesor: Máximo de 1656 metros en la quebrada Aramin.

Extensión geográfica: Cuenca inferior del río Tuy, Miranda oriental.

Contactos: La unidad es discordante sobre rocas metamórficas, aunque por lo menos localmente, es posible que descansa sobre la Formación Carenero. En el mapa de Feo-Codecido (1962), el contacto superior se muestra cubierto por sedimentos no definidos del Terciario Superior, que se han llamado Formación Guatire, y que según Bermúdez (1966), corresponden a la Formación Mamporal. En el lado sur de la cuenca, la unidad se ha señalado como discordante sobre rocas del Cretáceo, Eoceno e ígneas básicas. Según Dusenbury (1956, *Léxico Estratigráfico de Venezuela*), la Formación Tuy se interpone entre las formaciones Aramina y Guatire en el subsuelo, sin llegar a aflorar.

Fósiles: Dusenbury mencionó los moluscos *Anadara (Larkinia) waringi*, *Chione cancellata*, *Turritella abrupta*, *T. gatunensis*, *T. mimetes* y *Oliva cylindrica*, sin citar localidades. Bermúdez (1966) mencionó siete especies de foraminíferos de aguas someras reconocidas cerca de Los Fernández, y señaló adicionalmente que los ostrácodos estudiados por Van Den Bold, son de distribución estratigráfica restringida, en especial *Orionina fragilis*, presente también en la parte superior de la Formación Cubagua y en unidades de edad semejante en Trinidad.

Edad: Mencher *et al.* (1951) atribuyeron la unidad al Mioceno inferior; Bucher (1952), Dusenbury (1956, *Léxico Estratigráfico de Venezuela*) y Young *et al.* (1956), al Mioceno medio. Bermúdez (1966) la consideró Mioceno superior a base de su contenido de ostrácodos.

Correlación: La unidad se considera como equivalente lateral, de facies marina poco profunda, de la Formación Cumaca, presente también en la cuenca del bajo Tuy. Bermúdez (1966) sugirió otras correlaciones.

Referencias

Bermúdez, P. J., 1966. Consideraciones sobre los sedimentos del Mioceno Medio al Reciente de las costas central y oriental de Venezuela. (Primera parte). *Bol. Geol.*, Caracas, 7(14): 333-411.

Bucher, W. H., 1952. Geologic structure and orogenic history of Venezuela, *Geol. Soc. Am.*, Mem. 49, 113 p.

Dusenbury, A. N. y P. P. Wolcott, 1949. Rocas metamórficas cretácicas en la Cordillera de la Costa, Venezuela, *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petrol.*, Bol. (Venezuela), 1: 17-26.

Feo-Codecido, G., 1962. Contribución a la geología de Venezuela nor-central. *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petrol.*, Bol. Inform., 5(5): 119-142.

Mencher, E., H. J. Fichter, H. H. Renz, W. E. Wallis, J. M. Patterson and R. H. Robie, 1951. *Geological review*, chapter I, p. 1-75, in Text of papers presented at the National Petroleum Convention, Technical Office of Hydrocarbons, Ministry of Mines and Hydrocarbons, Caracas, Venezuela.

Ministerio de Minas e Hidrocarburos, 1956. Léxico Estratigráfico de Venezuela, Pub. Espec. N° 1, *Bol. Geol.*, p. 728.

Young, G. A., A. Bellizzia, H. H. Renz, F. W. Johnson, R. H. Robie y J. Masvall, 1956. Geología de las cuencas sedimentarias de Venezuela y de sus campos petrolíferos. *Bol. Geol.*, Caracas, Publ. Esp. N° 2, 140 p.

Bibliografía de Léxicos Anteriores

Smith, R. J., 1953. Geology of the Los Teques-Cúa region, Venezuela. *Geol. Soc. Amer.*, Bull., 64(1): 41-64.

Enviar Comentarios

	
1st Ed. English	Comentarios Recibidos



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)