

TERCIARIO (Eoceno Medio)

Estado Barinas

Referencia original: S. Osuna, O. Macsotay y R. Arnstein, 1995, p. 82.

Consideraciones históricas: Osuna, *et al.* (1995) fueron los primeros en proponer por publicación la división de la Formación Pagüey en tres miembros que, en orden ascendiente, son los "miembros" Arandia, La California e Higüerones. Los nombres fueron propuestos originalmente por Aguasuelos (1990, p. 198) y discutidos luego por Osuna (1994) en informes inéditos. Las dificultades en diferenciar los cambios sutiles de sus litologías, definir lateral y verticalmente sus contactos transicionales, y trazar las unidades regionalmente hacen dudoso su utilidad como nombres estratigráficos formales. Se aplican estos nombres informales principalmente en el área de afloramiento entre los ríos Santo Domingo y Calderas, y hasta el río Tucupido.

El Miembro Arandia tiene su sección tipo en la quebrada Arandia, afluente del río Calderas, estado Barinas, (Aguasuelos, 1990, p. 198). Consiste de lutitas negras, arcilíticas, duras, con intercalaciones delgadas de cuarzoarenitas de grano fino y concreciones ferruginosas o dolomíticas gris verdosas o parduscos en forma de rosario. Osuna (1994, p. 45) reporta un espesor de 500 m y microfósiles que indican una edad Eoceno Medio y un ambiente de plataforma externa a talud. En muestras de las quebradas Arandia, Bellaca e Higüerones, Arnstein y Di Gianni (en Osuna *op. cit.*, p. 32) identificaron los conjuntos siguientes: Foraminíferos planctónicos: *Acarinina bubrooki*, *A. broedermanni*, *Truncorotaloides rohri*, *T. topelensis*, *Hastegerina cf. bolivariana*, *Turborotalia cerroazulensis*, *T. cerroazulensis pomeroli*, *Globigerinatheka* sp. Nannoplancton Calcáreo: *Discoaster* aff. *binodosus*, *D. deflandrei*, *D. aff. barbadiense*, *Sphenolithus cf. furcatolithoides*, *S. predistentus*, *Reticulofenestra umbilica*, *Helicosphaera seminulum*, *H. lophota*, *Disoastertani* sp. La edad indicada por la microfauna planctónica es Eoceno Medio, zonas P-11 a P-14, Banner y Blow (1965). El ambiente de plataforma externa a talud es indicado por la fauna *Valvulina* sp., *Alveovalvulinella pozonensis*; *Valvulina flexilis*; *Bathysiphon* sp., *Operculinoides* sp. *Uvigerina havanensis* y *Lenticulina americana*. Cerca del contacto con el miembro La California se encontraron indicadores de condiciones de plataforma interna como son *Haplophagmoides carinatum*, *Ammobaculites delicatus* y *Miliammina* sp.

Véase [PAGUEY, Formación](#).

© G. D. Kiser, 1997

Referencias

Aguasuelos Ingeniería, S. C., 1990 Modernización de datos geológicos en el frente de montaña. Vol. III, Estratigrafía/Sedimentología. Corpoven S.A. *Informe Inédito*, 517 p.

Banner, F. T. y W. H. Blow, 1965. *Progress in the planktonic foraminiferal biostratigraphy of the Neogene*. Nature, 208(5016): 1164-1166.

Osuna, S., 1994. Geología de superficie del frente de montañas de Barinas. *Informe inédito Corpoven, S. A.*, 86 p.

Osuna, S., O. Macsotay y R. Arnstein, 1995. Sedimentación de antefosa Eoceno medio-superior en Barinas, Venezuela. *Boletín de Geología*, Publicación Especial 11.

[Enviar Comentarios](#)



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)