


**CRETACICO** (Cenomaniense-Maastrichtiense)

Estados Lara y Portuguesa

Referencia original: J. R. Bushman, 1959, p. 69.

Consideraciones históricas: Bushman (1959), usa nombre de Formación Barquisimeto para designar rocas de la secuencia cretácica que aflora en la región de Barquisimeto, estado Lara. El autor hizo poca referencia al estudio de la región adyacente realizado por Von der Osten y Zozaya (1957) y utiliza nombres diferentes para las rocas de la secuencia cretácica. Posteriormente, Bushman (1965) en la parte no metamorfozada de la secuencia del Cretácico tardío (Cenomaniense-Campaniense), describe una unidad inferior de capas argiláceas con fñanitas y calizas, Formación Barquisimeto y una secuencia suprayacente, predominantemente lutítica: Formación Barure y observa que la primera se asemeja en muchos aspectos a la secuencia Capacho-La Luna de Lara occidental.

Según Coronel y Renz (1960) las formaciones Barquisimeto y Barure de Bushman representan una acumulación heterogénea de mesas alóctonas cretácicas embebidas en un "wildflysch" del Terciario temprano. En ella reconocen equivalentes de las formaciones Querecual y Mucaria, tal como se reconocen más al oeste. El problema del autoctonismo versus aloctonismo fue debatido en monografías posteriores. En su análisis del problema Bellizzia y Rodríguez (1967) señalan que de acuerdo con el criterio aceptado actualmente, la teoría del desplome y deslizamiento de bloques cretácicos a una cuenca del Terciario temprano explica gran parte de las relaciones estratigráficas que se observan en Lara. De esta manera, el término Formación Barquisimeto se aplica para designar una mesa heterogénea de diversas unidades cretácicas. Más recientemente diferentes autores (Campos *et al.*, 1979; Bellizzia 1986; Macsotay *et al.*, 1987) estudian detalladamente la unidad, precisando ambiente de depositación, fósiles y edad. Aunque se admite la prioridad del término Formación Cazadero y su equivalencia con Barquisimeto (Von der Osten, 1967), se mantiene este último en la región de Barquisimeto, debido a su empleo mucho más generalizado. Sin embargo, se mantiene la validez del miembro de Cazadero en la región tipo.

Localidad tipo: Bushman (1959, 1965) no especificó una sección tipo para la formación, mencionando solo las colinas que circundan a la ciudad de Barquisimeto como buenas secciones de referencia. Coronel y Renz (1960) señalan como localidad tipo el cerro Volador al noroeste de la ciudad de Barquisimeto. Macsotay *et al.*, (1987) señala como la mejor sección, la expuesta en los cerros al sur de la carretera Lara -Zulia, entre la quebrada La Ruesca y el caserío llamado Mamón. (Hoja N° 6346, escala 1:100000, Cartografía Nacional).

Descripción litológica: Lutitas, limolitas, margas compactadas, fñanitas y calizas, de color gris oscuro a negro en estado fresco y tonos muy claros de gris al meteorizar. Las capas de calizas son muy discontinuas, y se destacan más en la parte inferior de la formación. Los porfidoblastos de pumpellyita y el carácter filítico de algunas capas indican un leve metamorfismo. Los miembros de la Formación Cazadero descritos por Von der Osten y Zozaya (*op. cit.*) se incluyen en la unidad.

Espesor: Las complicaciones estructurales impidieron mediciones precisas. Coronel y Renz (1960) mencionaron 1700 m en su sección del cerro Volador.

Extensión geográfica: Esta formación posee amplia distribución en Lara occidental, central y meridional, extendiéndose a la serranía de Portuguesa.

Contactos: Según Bushman (1959) la unidad es gradacional sobre calizas arenosas de la Formación Carorita, e infrayace gradacionalmente a las capas de peñones de la Formación Morán. Según Macsotay *et al.*, (*op. cit.*), Barquisimeto se depositó en hiatus y discordancia leve local, sobre la Formación Bobare y en ausencia de esta, sobre la Formación Carorita, y se halla cubierta en discordancia angular y erosional por la Formación Matatere.

Fósiles: Bushman (1959, 1965), Coronel y Renz (1960), Bellizzia y Rodríguez (1968), Bellizzia (1986) y Macsotay *et al.* (1987), mencionan conjuntos faunísticos entre los cuales destacan foraminíferos como: *Gumbelina globulosa*, *G. cretacea*, *Mammnites* sp., *Globigerina* sp., *Globo truncana* sp., y rudistas.

Edad: Analizando el contenido faunístico y sus relaciones de campo, la unidad se considera de edad Cenomaniense-Maastrichtiense.

Correlación: La Formación Barquisimeto se correlaciona con unidades autóctonas de la cordillera de La Costa: formaciones Mucaria, Río Chavez (hoy miembro), Agua Blanca, Chuspita y Yacambu (Macsoy *et al.*, 1987).

© **M. E. M. 3er Léxico**

Referencias

Bellizzia, A., 1986. Sistema montañoso del Caribe: Una Cordillera alóctona en la parte norte de América del Sur. *VI Cong. Geol. Venez.*, 10: 6657-6836.

Bellizzia, A. y G. D. Rodríguez, 1967. Guía de la excursión a la región de Duaca-Barquisimeto-Bobare. *Bol. Geol.* 8(16): 284-309.

Bellizzia, A. y G. D. Rodríguez, 1968. Consideraciones sobre la estratigrafía de los Estados Lara, Yaracuy, Cojedes y Carabobo. *Bol. Geol.* 9(18): 515-564.

Bushman, J. R., 1959. Geology of the Barquisimeto area- A summary report. *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról.*, Bol. Inform., 2(4): 65-84.

Bushman, J. R., 1965. Geología del área de Barquisimeto, Venezuela. *Bol. Geol.*, Caracas, 6(11): 3-111.

Campos, V.; V. Guedez y S. Osuna, 1979. Geología de la Serranía de Portuguesa, estados Portuguesa y Lara. *Bol. Geol.*, Caracas, 13(25): 3-40.

Coronel, G. y O. Renz, 1960. Deslizamientos submarinos al noroeste de Barquisimeto, Estado Lara. *III Cong. Geol. Venez.*, Caracas, 1959, Mem., 2: 743-759.

Macsoy O.; J. F., Stephan, y E. Alvarez, 1987. Grupo Lara: Sedimentitas oceánicas y peninsulares en el Cretáceo alóctono de Venezuela occidental. *Bol. Geol.*, (28): 3-78.

Von Der Osten, E., 1967. Stratigraphy of Central Lara. *Bol. Asoc. Ven. Geol. Min. y Petr.*, 10(11): 309-333.

Von Der Osten y D. Zozaya, 1957. Geología de la parte Suroeste del Estado Lara, Región de Quibor (Carta 2308), *Bol. Geol.* 4(9): 3-53.

Bibliografía de Léxicos Anteriores

Bellizzia, A. y D. Rodríguez, 1966. Guía de excursión a la región de Duaca-Barquisimeto-Bobare. *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petrol.*, Guía N° 4, 23 p.

Bushman, J. R., 1960. Guía para la excursión C-9. Carretera Barquisimeto-Carora, Estado Lara. *III Cong. Geol. Venez.*, Caracas, 1959, Mem., 1: 99-124.

Bushman, J. R., 1963. Un comentario sobre "Los deslizamientos submarinos al noroeste de Barquisimeto, Estado Lara". (Nota Técnica). *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról.*, Bol. Inform. 6(1): 21-26.

Coronel, G., 1963. Problemas geológicos de Barquisimeto. Una discusión. *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról.*, Bol. Inform., 6(7): 221-228.

Renz, O., 1960-a. Remarks on the Barquisimeto Trough. *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról.*, Bol. Inform., 3(7): 155-160.

Renz, O., 1960-b. Guía de la excursión C-8. Andes nororientales. Barquisimeto-Barbacoas (Estado Lara). *III Cong. Geol. Venez.*, Caracas, 1959, Mem., 1: 93-97.

Enviar Comentarios



2a Edicion LEV



Comentarios Recibidos



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)