

PRECAMBRICO

Estado Bolívar

Liddle (1928, 1946, p. 56) se refirió a este complejo en la parte nororiental de la Guayana venezolana, como las rocas gnéisicas (granitos gneisoides y gneises) más antiguas del país: "el complejo del basamento infrayace capas de cuarcitas ferruginosas de edad probablemente paleozoica. . .". Correlacionó a este "complejo de alto metamorfismo" con las rocas graníticas que forman el núcleo de las Guayanas Francesa, Holandesa y Británica, y el Brasil, al sur. López *et al.* (1942) describieron "gneises, esquistos micáceos, granitos y rocas cristalinas", todas porfídicas y metamórficas. En la zona de Santa Elena los pórfidos son rojos, y es la sierra de Pakaraima son grises; según los autores, la Formación Roraima suprayace discordantemente al "Complejo de Basamento". En la actualidad el término se considera mal definido y ha sido reemplazado en la literatura geológica por descripciones de las diversas unidades componentes del basamento en el Estado Bolívar.

Véanse [IMATACA, Complejo de](#); [PASTORA, Supergrupo](#); [SUPAMO, Complejo de](#); [CARUM, Formación](#); [CAICARA, Formación](#) y [CARICHAPO, Grupo](#).

Referencias

Liddle, R. A., 1928. *The geology of Venezuela and Trinidad*. J. P. Mc.Gowan, Fort Worth, Texas, 552 p.

Liddle, R. A., 1946, *The geology of Venezuela and Trinidad*. 2nd. Ed., Paleont. Res. Inst., Ithaca, N. Y., 890 p.

López, V. M.; E. Mencher y J. H. Brineman Jr., 1942. Geology of Southeastern Venezuela. *Geol. Soc. Amer.*, Bull., 53(6): 849-872.

Referencias

Bushman, J. R., 1959. Geology of the Barquisimeto area - A summary report. *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról.*, Bol. Inform., 2(4): 65-84.

Enviar Comentarios



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)