



CRETACICO (Maastrichtiense)

Estado Anzoátegui

Referencia original: H. H. Renz, 1962, Plate I.

A base del estudio de las faunas de foraminíferos bentónicos y planctónicos, Renz estableció una doble zonación (bentónica y planctónica) para los sedimentos del Cretáceo Tardío y Terciario

Temprano en la sección del río Querecual, Anzoátegui nororiental. Incluyó los sedimentos cretácicos más jóvenes en la Zona (bentónica) de *Gumbelina plummerae*, la cual dividió en dos subzonas, de las cuales la inferior es la de *Bolivinoides rhomboidea*.

En su cuadro faunal, Renz indicó las siguientes especies como restringida a esta su zona: *Bolivinoides rhomboidea*, *Chrysalogonium cretaceum*, *Dentalina megapolitana*, *Marginulina jarvisi*, *Palmula jarvisi*, *Siphogenerinoides bramlettei*, *Vaginulina barcoensis*, *Valvulineria allomorphinoides*, *Ventilabrella carseyae*.

En la sección del río Querecual, la Subzona de *Bolivinoides rhomboidea* corresponde a la parte media-inferior de la Formación Vidoño, y es de edad Maastrichtiense.

Véase [**GÜMBELINA PLUMMBRAE**, Zona de](#)

Referencias

Renz, H. H., 1962. Stratigraphy and paleontology of the type section of Santa Anita Group and overlying Merecure Group, río Querecual, State of Anzoátegui, northeastern Venezuela. *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petrol.*, Bol. Inform. 5(4): 89-108.

Enviar Comentarios



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)