




PALEOGENO (Eoceno Tardío)

Estado Falcón

Referencia original: A. Senn, 1935, p. 58.

Consideraciones históricas: El nombre fue usado por primera vez por Seen (1935), para designar la sección lutítica que aflora en el cerro Mision, distrito Silva, estado Falcón. El término fue elevado a rango formacional por Liddle (1946), quien lo empleó en conjunto con los nombres Formación Paují y Lutitas de Tupure. Renz (1948 y 1956) describe la unidad. Wheeler (1960 y 1963), la trata de manera breve, correlacionándola con la Formación Jarillal. Hunter (1972 y 1974) reporta su fauna de foraminíferos, y discute la existencia de una unidad más antigua que infrayace a la Formación Cerro Mision, en el Alto de Esperanza. Camacho *et al.* (1989) describen la unidad en la región de Sanare-Buena Vista.

Localidad tipo: Cerro Mision, distrito Silva, estado Falcón. Hoja 6448, esc. 1:100.000, Cartografía Nacional.

Descripción litológica: Según Renz (1948), la Formación Cerro Mision consiste de lutitas calcáreas, de color gris oscuro. Según Hunter (1972), es una lutita marina de color gris oscuro, calcárea, ricamente microfósilífera.

Espesor: Según Renz (1948), el espesor debe ser superior a 400 m. Camacho *et al.* (1989) midieron una sección incompleta de 130 m en la región de Sanare-Buena Vista.

Extensión geográfica: Según Renz (1948), la Formación Cerro Mision aflora en el borde sur de la cuenca de Falcón oriental, habiendo sido penetrada por varios pozos en Riecito y en El Mene de Acosta. Esta formación aflora en los altos de La Esperanza y Guacharaca, en Falcón nororiental.

Contactos: Según Renz (1948), la sección sedimentaria del Terciario en Falcón oriental comienza con la Formación Cerro Mision de edad Eoceno Tardío (u otras formaciones equivalentes), que parecen suprayacer transgresivamente sobre formaciones más antiguas de edad desconocida. El mismo autor (Renz, 1956) en el L.E.V. I, dice que la base de Cerro Mision no está expuesta y que dicha formación, grada concordantemente hacia arriba a la Formación Guacharaca. El contacto inferior se desconoce en su localidad tipo. Hunter (1972), en un estudio efectuado en el alto de Esperanza-Guacharaca, lo coloca como discordante encima de una secuencia flysch de edad Eoceno Medio. Suter (1974) considera el contacto superior con la Formación Guacharaca como discordante, al igual que Wheeler (1960, 1963).

Fósiles: Renz (1948), da una lista de fósiles común a las formaciones Cerro Mision, donde destaca la presencia de *Bulimina jacksonensis*, *Dentalina jacksonensis*, *Hantkenina alabamensis* y otros. Hunter (1972), reporta la presencia de ricas faunas de foraminíferos planctónicos, en el flanco sur del Alto de Guacharaca, en los niveles lutíticos que suprayacen a los depósitos de flysch y destaca *Hantkenina alabamensis*, *H. primitiva*, *Clavigerinella* cf. *jarvisi*, *Globorotalia centralis*, *Globigerinatheka barri*, *Globigerina linaperta* y otros. Camacho *et al.* (1989) indican la presencia de los foraminíferos béticos *Melonis* cf. *pompilioides*, *Melonis* sp., *Uvigerina* sp. y los planctónicos *Globigerina eocena*, *Turborotalia cerroazulensis*, *Hantkenina alabamensis*, *H. cf. primitiva*.

Edad: Según Renz (1948), la presencia de *Hantkenina alabamensis* en esta formación, indica una edad no más joven que Eoceno Tardío. Hunter (1972), en base a la fauna de foraminíferos presentes en la formación, sugirió una equivalencia en edad con la zona de *Globigerinatheka semiinvoluta*, del Eoceno Tardío, aunque reporta la ausencia de los marcadores de dicha zona. La microfauna reportada por Camacho *et al.* (1989) es igualmente indicativa de una edad Eoceno Tardío.

Correlación: Liddle (1946) y Renz (1948, LEV, 1956) la correlacionan con la Formación Paují de la cuenca de Maracaibo. Wheeler (1960, 1963) correlaciona esta unidad, con la Formación Jarillal del grupo Agua Negra de Falcón surcentral.

Paleoambiente: Según Hunter (1972) la Formación Cerro Mision es una lutita marina. La microfauna bética reportada por Camacho *et al.* (1989) es indicativa de profundidades batiales.

(Actualizado por: María Lourdes Díaz de Gamero, agosto 1997)

Referencias

- Camacho, A., M. Mijares y W. Scherer, 1989. Geología de la zona Sanare-Buena Vista, sector Agua Linda, estado Falcón, Venezuela, *Revista Geos*, Caracas, 29: 18-24.
- Hunter, V. F., 1972. A middle Eocene flysch from east Falcón, Venezuela, *VI Conf. Geol. del Caribe*, Porlamar, estado Nueva Esparta, p. 126-130.
- Hunter, V. F., 1974. The mid-Tertiary stratigraphic unit of the southern Caribbean area, *Verhandl. Naturf. Ges.*, 84(1): 172-190.
- Liddle, R. A., 1946. *The geology of Venezuela and Trinidad*, (2nd. ed.) Paleont. Res. Inst., Ithaca, New York, 890 p.
- Ministerio de Minas e Hidrocarburos, 1956, Léxico Estratigráfico de Venezuela, *Bol. Geol. (Venezuela) Publ. Esp.*, 1: 1-728
- Renz, H. H, 1948. Stratigraphy and fauna of the Agua Salada group, State of Falcón, Venezuela, *Geol. Soc. Am.*, Mem., 32, 219 p.
- Senn, A., 1935. Die stratigraphische Verbreitung der Tertiären Orbitoiden, mit spezieller Berücksichtigung ihres Vorkommens in Nord-Venezuela und Nord-Marokko. *Eclog. Geol. Helv.* 28(1): 51-113, 369-373.
- Wheeler, C. B., 1960. Estratigrafía del Oligoceno y Mioceno Inferior de Falcón Occidental y Nororiental. *III Cong. Geol. Venez.*, Tomo 1 *Bol. Geol. Public Espc.* (3): 407-465.
- Wheeler C. B., 1963. Oligocene and lower Miocene stratigraphy of western and northeastern Falcón Basin, Venezuela. *Amer. Assoc. Petr. Geol. Bull.*, 47(1): 35-68.

Bibliografía de Léxicos Anteriores

- Senn, A., 1940. Paleogene of Barbados and its bearing on history and structure of Antillean-Caribbean region, *Am. Assoc. Petrol. Geol., Bull.*, 24(8): 1548-1610.

Enviar Comentarios

		
2a Edicion LEV	1st Ed. English	Comentarios Recibidos



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)