




CRETACICO ?

Estado Portuguesa

Referencia original: Murray, 1973, p.

Consideraciones históricas: Este cuerpo ultramáfico fue señalado por primera vez por Bucher (1952), aunque sin asignarle nombre formal. Von Der Osten y Zozaya (1957) lo mencionan informalmente como Roca Ignea del Río Guache, describiendo someramente su composición. Metz (1960) lo mencionó como parte del Complejo de Morador. Murray (1973) presentó una descripción formal y detallada de la unidad, dándole el nombre de Complejo Ultramáfico de Cerro Pelón. Campos *et al.* (1977) lo señalan entre las numerosas masas alóctonas de diferentes litologías contenidas en la Formación Río Guache. Skerlec y Hardgraves (1980) realizaron determinaciones de paleomagnetismo en muestras del Complejo.

Localidad tipo: El Cerro Pelón se ubica a 23 km al oeste de Acarigua, distrito Araure, estado Portuguesa. Hoja 6344, escala 1:100.000, Cartografía Nacional.

Descripción litológica: Este Complejo está compuesto por un núcleo central de dunita en la cresta y laderas de cerro Pelón, rodeado por masas concéntricas de piroxenita y gabro. En muestras frescas presenta color verde a verde oscuro, según el grado de serpentinización, que por meteorización pasa a pardo. Los minerales constituyentes son olivino en cristales anhedrales, espinela en granos euhedrales y clinopiroxeno. El olivino presenta serpentinización en los bordes de los granos, y a lo largo de las fracturas intergranulares.

La piroxenita olivivinífera aflora en los flancos del cerro, es una roca densa, de grano medio, compuesta por cristales anhedrales a subahedrales de clinopiroxeno, con granos redondeados menores y agregados de olivino. En el borde sureste del Complejo, un dique de diorita hornbléndica corta a la piroxenita.

Se han descrito peñones sueltos de gabro hornbléndico, pero no ha sido observado *in situ*, según Murray (1973) no debe aflorar muy lejos de su posición original. Se trata de una roca de grano grueso a medio, formada por hornblenda, plagioclasa y clinopiroxeno. Tanto la piroxenita como el gabro hornbléndico, forman vetas y diques de 1 a 20 cm de espesor, dentro de la dunita. El mismo autor señala la existencia de metamorfismo de contacto, a lo largo del borde occidental del Complejo, con presencia de hornfel hornbléndico, formados por plagioclasa, hornblenda, clinopiroxeno, esfena y magnetita.

Extensión geográfica: Forma un cuerpo ovalado de 2 km de largo por 1,5 de ancho, limitado al área de Cerro Pelón.

Contactos: Murray (1973) indica que es intrusivo en las rocas metamórficas del Grupo Los Cristales. En el lado oriental del [Complejo](#), una falla separa las ultramáficas de la Formación Río Guache.

Edad: Por su semejanza con el Complejo de Chacao, Murray (1973) considera que el Complejo Ultramáfico de Cerro Pelón sea de edad Cretácico.

Correlación: Se correlaciona con el Complejo de Chacao, Guárico y el Complejo de Apa, Miranda.

Paleoambientes: Murray (1973) considera que este Complejo al igual que el de Chacao, se ha formado por diferenciación en una cámara magmática subyacente a un arco volcánico. Para explicar la ubicación actual del Complejo, Campos *et al.* (1977) consideran que corresponde a un bloque alóctono dentro de la facies con olistolitos y peñones de la Formación Río Guache.

Sinonimia: Roca Ignea de Río Guache de Von der Osten y Zozaya (1957).

Ilustraciones: [Mapa Complejo Ultramáfico de Cerro Pelón](#).

Referencias

- Bucher, W., 1952. Geologic structure and orogenic history of Venezuela. *Geol. Soc. Amer.*, Mem. 49, 113 p.
- Campos, V., S. Osuna y V. Guedez, 1977. Geología de la región al noroeste de Acarigua y al sur de la falla de Boconó. *Bol. Geol.*, Caracas, Public. Esp. 7, 3: 1669-1680.
- Metz, H. L., 1960. Un complejo sedimentario-metamórfico sobrecorrido en el estado Portuguesa. *Bol. Geol.*, Caracas, Publ. esp. 3, 2: 827-837.
- Murray, C. G., 1973. Estudios petrológicos de complejos ultramáficos zonados en Venezuela y Alaska. *Bol. Geol.*, Caracas, 12(22): 173-279.
- Skerlec y Hardgraves, 1980. ??????????????????????????????????????
- Von der Osten, E. y D. Zozaya, 1957. Geología de la parte suroeste del estado Lara. Región de Quíbor (Carta 2308). *Bol. Geol.*, Caracas, 4(9): 3-52.

Enviar Comentarios



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)