

PRE - MESOZOICO ?

Estado Aragua

Referencia original: F. Santamaría y C. Schubert, 1974, p. 1093.

Consideraciones históricas: Rodríguez (1972) presenta un mapa geológico donde cartografía su "Granito de Rancho Grande", pero que lo describe. Santamaría y Schubert (1974) realizan algunas determinaciones de edades K/Ar y lo denominan como "Granito de Choroni". Kohn *et al.* (1984) presentan varias determinaciones de edad por huellas de fisión. Beck (1985, 1986) y Ostos (1990, p. 200) lo mencionan brevemente igualmente denominándolo "Granito de Choroni". Novoa y Rodríguez (1990) presentan un estudio detallado de esta unidad en la parte aflorante al sur de la Fila Maestra de la Cordillera de la Costa al norte de Maracay, sugiriendo denominarlo "Gneis Granítico de Choroni". Ave Lallemant *et al.* (1993) lo mencionan en su resumen sobre la estructura de la Cordillera de la Costa.

Localidad tipo: No se ha definido con exactitud, pero Novoa y Rodríguez (1990) mencionan que los mejores afloramientos se encuentran en el cerro Choroni, en la carretera El Castaño - Choroni, estado Aragua. Hoja 6647, escala 1:100.000, Cartografía Nacional.

Descripción litológica: Beck (1985, p. 310, 1986) lo describe como homogéneo, de grano grueso y deformado con una foliación visible, petrográficamente indica una composición de cuarzo (cerca del 40%), feldespato K (35 - 40%), plagioclasa determinada como albita, biotita marrón fuertemente cloritizada, así como biotita verde y marrón verde, mica blanca, epidoto, pequeños granates, esfena y trazas de posible anfíbol marrón. Los feldespatos potásicos se presenta en granos de hasta 5 mm y son muy peritéticos. Novoa y Rodríguez (1990, p. 23) encuentran dentro de esta unidad una serie de gneises que se diferencian por las proporciones relativas entre los feldespatos, cuarzo y micas. El tamaño de granos varía de 1 a 3 mm, considerándose como un gneis de grano medio, granoblástico, foliación poco desarrollada, se presentan numerosas vetas de cuarzo en ocasiones plegadas. El tipo de gneis principal (feldespático cuarcífero micáceo) presenta feldespato potásico con marcada textura peritética, maclado tipo carlsbad y el enrejado típico del microclino; la plagioclasa (andesina) está usualmente alterada a sericita y epidoto, algunos granos presentan esta alteración en el centro, con bordes limpios, representando una textura zonada; la biotita es moderadamente pleocroica, de color pardo oscuro a marrón, ocasionalmente transformada a clorita; además hay cantidades menores de granate, epidoto, esfena, apatito, hematita, leucoxeno y magnetita.

Extensión geográfica: El cuerpo se extiende por unos 35 km de largo en una orientación aproximadamente este - oeste, por unos 5 km de ancho (Rodríguez, 1972).

Expresión topográfica: Forma las cumbres de la Fila Maestra de la Cordillera de la Costa entre las carreteras que conducen desde Maracay, hasta Ocumare de la Costa y hasta Choroni, por lo tanto esta unidad soporta el núcleo de la Cordillera, con una topografía extremadamente abrupta, especialmente en el flanco norte.

Contactos: Se presentan como abruptos y concordantes con las rocas del Esquisto de San Julián que lo circundan (Unidad de esquisto cuarzo micáceo de Novoa y Rodríguez, 1990), si bien en algunos sectores el contacto es a través de fallas de ángulo alto transcurrentes dextrales (Beck, 1985, p. 310, 1986; Novoa y Rodríguez, 1990).

Edad: Santamaría y Schubert (1974) presentan dos edades K/Ar de biotita (30,0(1,9 y 30,0(1,8 m.a.), mientras que Kohn *et al.* (1984) determinaron cuatro edades por huellas de fisión en apatito con un intervalo de 17,5 a 24,1 m.a., y una edad de 126(15 m.a. en esfena. Estas cifras representan edades de estadios sucesivos de la historia metamórfica y del levantamiento de cuerpo, pero al no haberse obtenido ninguna isocrona de Rb/Sr de roca total, se desconoce la edad de la cristalización de este cuerpo. Se presume una tentativa edad pre-Mesozoica al igual que los otros cuerpos graníticos de la Cordillera de la Costa.

Correlación: Se ha correlacionado con el Granito de Guaremal. Beck (1985, p. 311, 1986) señala que esta unidad es muy semejante a su Granito de El Limón, aflorante al norte de la Colonia Tovar, estado Aragua.

Geoquímica: Santamaría y Schubert (1974) presentan algunos análisis químicos de roca total y algunos elementos trazas, encontrando que corresponden a una asociación calcoalcalina, al igual que el Granito de Guaremal.

Sinonimia: Rancho Grande, Granito de; Choroní, Granito de

Ilustraciones: [Los granitoides de la Cordillera de la Costa](#) y [Detalle del corte del granito de Choroni](#).

© **F. Urbani P., 1997**

Referencias

Ave Lallemant, H. G., V. B. Sisson y J. E. Wright, 1993. Structure of the Cordillera de la Costa Belt, north-central Venezuela; implications for plate tectonic models (Resumen). *AAPG Bulletin*, 77(2): 304.

Beck, C., 1985. La chaîne Caraïbe au merideien de Caracas: geologie, tectogenese, place dans l'evolution geodynamique Mesozoique-Cenozoique des Caraïbes Meridionales. L'Universite des Sciences et Techniques de Lille, *Tesis de doctorado de estado*, 462 p.

Beck, C., 1986. Geologie de la chaîne Caraïbe su meridien de Caracas (Venezuela). *Soc. Geol. de Nord*, Villeneuve s'Ascq, Francia, Public. no. 14, 462 p.

Kohn, B. P., R. Shagam y T. Subieta, 1984. Results and preliminary implications of sixteen fission-track ages from rocks of the western Caribbean Mountains System. *Geol. Soc. Amer. Memoir* 162, p. 415-421.

Ostos, M., 1990. Evolución tectónica del margen sur - central del Caribe basado en datos geoquímicos. *Geos*, Caracas, (30): 1-294.

Santamaría, F. y C. Schubert, 1974. Geochemistry and geochronology of the Southern Caribbean - Northern Venezuela plate boundary. *Bull. Geol. Soc. Amer.*, 85(7): 1085-1098. Versión en español: Bol. Inf. Asoc. Venez. Geol. Min. Petrol., 18(1): 1-38, 1975.

Novoa, E. y C. Rodríguez, 1990. Geología de una zona ubicada al norte de la ciudad de Maracay, Aragua. Universidad Central de Venezuela, Fac. Ingeniería, Escuela de Geología, Minas y Geofísica, *Trabajo especial de grado*, 121 p.

Rodríguez, D., 1972. Geología de la región de Choroni - Colonia Tovar y lago de Valencia (Resumen y mapa). *Bol. Geol.*, Caracas, Public. esp. 5, 3: 1783-1784.

Enviar Comentarios



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)