

CRETACICO (Albiense)

Estado Barinas

Referencia original: Mackenzie, 1937, 1938-a.

Consideraciones históricas: El nombre de "Formación Calderas" fue publicado originalmente por Mackenzie (1937, 1938-a) para designar los conglomerados basales y areniscas de la secuencia cretácica en Barinas septentrional. Como localidad tipo, se especificó el cañón del río Calderas, 8,5 km al sureste del aldea del mismo nombre.

En la cuenca de Barinas, la unidad ha sido tratada con varios nombres, particularmente en al afloramiento. Algunos (Mackenzie, 1937, 1938; Pierce, 1960; Aguasuelos, 1990, Osuna, 1994) utilizaron el término Calderas; otros lo llamaron Río Negro (Kiser, 1961, Schubert, 1968; Campos, 1977) y otros, Aguardiente (Renz, 1959; Gaenslen, 1962, Kiser, 1989-a). Contrario a lo dicho en el Léxico Estratigráfico del 1970, Gaenslen (*op. cit.*) aplicó el término Río Negro a todos las clásticos basales cretácicos del occidente del país con dos excepciones: el Surco de la Goajira y el piedemonte surandino "en donde Apón está solapado y Aguardiente descansa directamente encima del basamento" (traducción del suscrito).

Los argumentos y ilustraciones de Renz (1959) y Gaenslen (1962) y los de Kiser (1997) son los mas convincentes en demostrar que la Formación Río Negro está solapada, hacia el flanco sureste del Surco de Uribante, por la Formación Apón que, en su turno, está solapada por las formaciones Aguardiente y Maraca. Por lo tanto, Río Negro no aflora en el piedemonte surandino sino mas al noroeste dentro de los Andes. La confusión en el uso de la nomenclatura se debe básicamente a que los clásticos basales del piedemonte aparentan ser mayormente de ambiente continental. Sin embargo, la profunda meteorización obviamente presente en el Cretácico de todo el piedemonte surandino pueda haber destruido toda evidencia de fósiles o minerales de ambiente marino. En la región del río Santo Domingo, Aguasuelos (*op. cit.*) identificaron icnofósiles y un bivalvo indicativos de ambiente marino somero, *Thalassinoides* y *Aetostieon latissimus*. Se recomienda mantener el nombre "Calderas" como inválido.

© G. D. Kiser, 1997

Referencias

Aguasuelos Ingenieria, S. C., 1990 Modernización de datos geológicos en el frente de montaña. Vol. III, Estratigrafía/Sedimentología. Corpoven S.A. *Informe Inédito*, 517 p.

Campos, V. M., 1977. Estratigrafía de la secuencia post-paleozoica en la región de Calderas. Mem., *II Congr. Latinoamericano de Geología*, Minis. Min. e Hidrocarb., Caracas, 1973, (III): 1724-1741.

Gaenslen, G., 1962. A disscission of the Cretaceous stratigraphy of the southwest Barinas mountain front. (Nota técnica). *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról.*, Bol. Inform., 5(3): 65-74.

Kiser, G. D., 1961. Review of the Cretaceous stratigraphy of the southwest mountain front. *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról.*, Bol. Inform., 4(11): 335-359.

Kiser, G. D., 1989-a. Electrofacies de Parángula basal y sus equivalentes de la Formación Carbonera, Cuenca Apure-Barinas. *VII Congreso Geológico Venezolano*, 1989, Memoria Tomo I, 459-466.

Kiser, G. D., 1997. *Notas geológicas sobre datos inéditos (Corpoven, S.A.) de Barinas y el frente de montaña*. En prensa, p. 19.

Mackenzie, A. N., 1937-a. Sección geológica de la región de Barinas: Distritos Barinas, Bolívar y Obispos del Estado Barinas, Venezuela. *Bol. Geol. y Min.*, Caracas, 1(2-4): 269-283.

Mackenzie, A. N., 1937-b. The geologic section of the Barinas region, Districts of barinas, Bolívar and Obispos, State of Zamora, Venezuela. *Bol. Geol. y Min.*, Caracas, 1(2-4): 253-266 (ed. en inglés).

Mackenzie, 1938-a. ???

Ministerio de Minas e Hidrocarburos, 1970. Léxico Estratigráfico de Venezuela, *Bol. Geol.*, Pub. Espec. N° 4, 756 p.

Osuna, S., 1994. Geología de superficie del frente de montañas de Barinas. *Informe inédito Corpoven, S. A.*, 86 p.

Pierce, G. R., 1960. Geología de la cuenca de Barinas. *III Cong. Geol. Venez.*, Caracas, 1959, Mem., 1: 214-276.

Renz, O., 1959. Estratigrafía del Cretaceo en Venezuela Occidental. Boletín de Geología., Minis. Min. e Hidrocarb., Caracas, 5(10): 3-48.

Schubert, C., 1968. Geología de la región de Barinitas-Santo Domingo, Andes venezolanos surorientales. *Bol. Geol.*, Caracas, 9(19): 182-261.

Bibliografía de Léxicos Anteriores

Sociedad Venezolana de Ingenieros de Petróleo, 1963. Aspectos de la industria petrolera en Venezuela. *I Cong. Venez. Petról.*, Caracas, 1962, 850 p. (Cuadro de correlación entre pág. 188-189). Reimpreso en: *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petrol.*, Bol. Inform., 1963, 6(11); 1964, 7(5).

Enviar Comentarios

2a Edicion LEV	1st Ed. English	Comentarios Recibidos

 [REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)