


## CIMARRONA, Miembro (Formación Barquisimeto)

VALIDO



### CRETACICO TARDIO

Estado Lara

**Referencia original:** E. Von der Osten y D. Zozaya, 1957, p. 12-14.

Von der Osten y Zozaya (1957) definieron la Formación Cazadero y la dividieron en siete miembros, con el Miembro Cimarrona como unidad basal, con un espesor de más de 100 metros de finitas de color gris a negro, delgadamente estratificadas y algunas lentes de caliza, que meteorizan en color amarillo rojizo. Según Rod (1959) los dos miembros superiores (Patanemo y Mamoncito) definidos por Von der Osten y Zozaya representan una repetición estructural del miembro basal, pero esto fue posteriormente negado por Von der Osten (1967). El término Cazadero ha sido sustituido por el de Formación Barquisimeto pero sus miembros retienen su validez en la localidad de la descripción original.

Véase [BARQUISIMETO, Formación](#).

### Referencias

Rod, E., 1959-a. West and of Serranía del Interior, eastern Venezuela. *Amer. Assoc. Petrol. Geol., Bull.*, 43(4): 772-789.

Rod, E., 1959-b. Formación Capacho en Trujillo septentrional y en Lara suroriental, *Bol. Geol.*, Caracas, 5(10): 49-66.

Von der Osten, E. y D. Zozaya, 1957. Geología de la parte suroeste del Estado Lara región de Quibor (Carta 2.308). *Bol. Geol.*, Caracas, 4(9): 3-52.

Von der Osten, E., 1967. Stratigraphy of Central Lara. *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról.*, Bol. Inform., 10(11): 309-323.

Enviar Comentarios



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)