


**CRETACICO** (Albiense)

Estado Cojedes

Referencia original: O. Renz, y K. C. Short, 1960, p. 8.**Consideraciones históricas:** Este nombre fue propuesto originalmente por Renz y Short (1960), para designar una unidad esencialmente clástica que forma parte de la secuencia cretácea en el

Estado Cojedes. En el área de El Tinaco, los mismos autores la llamaron informalmente "Cretáceo Inferior", término que excluye las "calizas del Cretáceo inferior" de la región de Carabobo oriental, descritas posteriormente por Oxburgh (1960) e incluidas por Menéndez (1965) en la Formación Tucutunemo.

Localidad tipo: Colina al sur del cerro La Vieja, 9 kilómetros al noroeste de Agua Blanca, Estado Cojedes. Una sección de referencia que expone la parte superior de la unidad y su contacto con la formación Mapuey suprayacente, aflora al sur de Boquerón (kilómetro 112 de la carretera Guanare-San Carlos), unos 7 kilómetros al este-noreste de Agua Blanca. Hoja 6444, Esc. 1:100.000 de Cartografía Nacional.

Descripción litológica: La litología de la Formación Cojedes se caracteriza, según Bushman (1967), por areniscas feldespáticas y horizontes delgados en su mayoría calcáreos; el tamaño de grano varía considerablemente alcanzando hasta 20 cm en peñas y peñones de cuarzo, cuarcita, filita, caliza y gneis. Las calizas forman capas espesas a macizas, frecuentemente interestratificadas con areniscas y asperones, lentes y capas de conglomerados compuestos principalmente por fragmentos de caliza. En el área de El Tinaco, Menéndez (1965), describió conglomerados arcósicos, calcáreos, lenticulares, de unos 5 m de espesor en la base, seguidos de caliza gris oscura maciza, en parte arenosa y en parte conglomerática, con fragmentos redondeados de rocas graníticas, gneises y cuarzo de veta, de unos 40 metros de espesor.

Espesor: Según Renz y Short (1960), al norte del cerro La Vigía y en el cerro Araguita se midieron 250 y 300 metros de espesor respectivamente, pero este puede alcanzar 680 metros. Menéndez (1965) calculó 45 metros de espesor en el bloque de Pilancones.

Extensión geográfica: Parte norte del estado Cojedes, localidad de Boquerón; bloque de falla de Pilancones, unos 10 kilómetros al norte de El Pao, y al este de él; cerro Morrocayos; cerro Araguita y al norte del cerro La Vigía.

Contactos: Renz y Short (1960) situaron el contacto inferior en la primera aparición de conglomerados de caliza. El tope aflora con menos claridad al sur de Boquerón y se sitúa donde desaparecen las capas de conglomerados y arcosa. En la ladera oeste del cerro Pilancones (Menéndez, 1965) la Formación Cojedes recubre discordantemente la zona de inyección del Complejo de El Tinaco e infrayace con aparente concordancia a la Formación Pilancones, volcánica.

Fósiles: Rod y Maync (1945) mencionan *Orbitolina* en el cerro Pilancones y Renz y Short (1960) hallaron *Orbitolina*, *Cuneolina*, *Coskinolina* y *Miliolidae* al norte y oeste del cerro La Vigía.

Edad: Cretáceo inferior (Albiense).

Correlación: Los autores originales correlacionaron la unidad con la Formación Tucutunemo. Menéndez (1965) la correlacionó con la Formación El Cantil de Venezuela oriental y con la parte superior del grupo Cogollo de Venezuela occidental, y Bushman (1967) con la Formación Los Cristales definida por él.

Paleoambiente: La presencia de rudistidos sugiere ambientes marinos someros y las características sedimentarias sugieren transporte por corriente de turbiedad.

Sinonimia: "Caliza inferior".

© Oscar Odreman, 1997

Referencias

Bushman, J. R., 1965. Geología del área de Barquisimeto, Venezuela. *Bol. Geol.* 6(11): 3-11.

Menéndez, A., 1965. Geología del área de El Tinaco, centro norte del Estado Cojedes. *Bol. Geol.* 6(12): 417-543.

Oxburgh, E. R., 1960. Geología de la región oriental del Estado Carabobo, Venezuela. *Bol. Geol.*, 11:113-208.

Renz, O. y K. C. Short, 1960. Estratigrafía de la región comprendida entre El Pao y Acarigua, Estados Cojedes y Portuguesa. *III Congr. Geol. Venezolana*, Caracas, 1959, Mem. 1: 277-315.

Rod E., y W. Maync, 1954. Revision of lower cretaceous stratigraphy of Venezuela. *Amer. Asoc. Petrol. Geol.*, Bull., 38(2): 193-283.

Bibliografía de Léxicos Anteriores

Bushman, J. R., 1967. Geología de la región entre Agua Blanca y San Carlos. Venezuela. *Bol. Geol.*, Caracas, 8(16): 311-336.

Shagam, R., 1960-a. Geología de Aragua central (Venezuela). *III Cong. Geol. Venez.*, Caracas, 1959, 2: 574-675.

Shagam, R., 1960-b. Geology of central Aragua, Venezuela. *Geol. Soc. Amer.*, Bull., 71(3): 249-302.

Enviar Comentarios



2a Edicion LEV



Comentarios Recibidos



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)