




PALEOGENO (Oligoceno Tardío)

Estado Falcón

Referencia original: C. B. Wheeler, 1960, p. 427

La referencia original es de Wheeler (1960), que publicó la subdivisión de la Formación Guacharaca en tres miembros, de los cuales el más joven es el Miembro de Arcillas de Cotiza. Se encuentra bien expuesto donde la carretera El Pozón-Mirimire corta la quebrada Cotiza. La unidad se reconoce, asimismo, en el flanco norte del alto de Guacharaca, aunque no en el flanco sur, por razones que se desconocen. Tomando en cuenta que la subdivisión en miembros efectuada por Wheeler (1960) a la Formación Guacharaca ha creado confusión con los miembros mencionados anteriormente por Suter (1947) y no ha tenido acogida por autores posteriores, ya que ni siquiera ha sido mencionada por Wheeler (1963), se considera preferible considerar estos miembros como inválidos.

© **M. L. Díaz de Gamero, 1997**

(Actualizado por: María Lourdes Díaz de Gamero, agosto 1997)

Referencias

Sutter, H. H., 1947. El Mene de Acosta field, Falcón, Venezuela, *Am. Assoc. Petrol. Geol., Bull.*, 31(12): 2193-2206.

Wheeler, C. B., 1960. Estratigrafía del Oligoceno y Mioceno Inferior de Falcón Occidental y Nororiental *III Cong. Geol. Venez.*, Tomo I, Bol. Geol. Public. Espec. (3): 407-465.

Bibliografía de Léxicos Anteriores

Blow, 1959. Age, correlation and biostratigraphy of the Upper Tocuyo (San Lorenzo) and Pozón formations, eastern Falcón, Venezuela. *Bull. Amer. Paleont.*, 39(178): 67-252.

Renz, H. H., 1948. Stratigraphy and fauna of the Agua Salada group, State of Falcón, Venezuela, *Geol. Soc. Am.*, Men. 32, 219 p.

Wheeler, C. B., 1963. Oligocene and Lower Miocene stratigraphy of western and northeastern Falcón Basin, Venezuela. *Amer. Assoc. Petrol. Geol. Bull.*, 47(1): 35-68. Resumen (1963) en: *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petrol.*, Bol. Inform., 6(5): 154.

Enviar Comentarios



2a Edición LEV



Comentarios Recibidos



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)