

TERCIARIO (Eoceno)

Estado Trujillo

El Miembro de Caliza de Cuicas, introducido por Sutton (1946, p. 1667-1668) designa la parte basal de la Formación Misoa. Cizancourt y Frizzell (1949) mencionan la Formación Cuicas, con *Ferayina coralliformis*. Cizancourt (1951) describe las Calizas de Cuicas en la secuencia suprayacente a la "Zona de *Nummulites* encordelados", con los siguientes fósiles: *Pseudophragmina (Proporocyclina) renzi*, *Operculinoides oliveri*, *Lepidocyclina* sp., etc. Salvador (1961-b) incluyó el intervalo en la Formación Valle Hondo.

Véase [VALLE HONDO, Formación](#).

Referencias

Cizancourt, M. de and D. L. Frizzell, 1949. Ferayina in the middle Eocene of Venezuela, *Jour. Paleont.*, 23(6): 496-497.

Cizancourt, M. de, 1951. Grands Foraminifères du Paléocène, de l'Eocène inférieur et de l'Eocène moyen du Vénézuéla, *Mém. Soc. Géol. de France*, 30(1-2)(Mém. 64): 68.

Salvador, A., 1961-b. Guidebook to the geology of northeastern Trujillo. *Soc. Geol. Venez. Occid.*, Guidebook No. 3, 33 p.

Sutton, F. A., 1946. Geology of Maracaibo basin, Venezuela, *Am. Assoc. Petrol. Geol.*, Bull., 30(10): 1621-1741.

Bibliografía de Léxicos Anteriores

Caudri, C. M. B., 1948. Note on the stratigraphic distribution of Lepidorbitoides, *Jour. Paleont.*, 22(4): 473-481.

Cizancourt, M. de, 1948. Matériaux pour la paléontologie et la stratigraphie des régions Caraïbes, *Soc. Géol. France*, Bull., 18: 663-674.

González de Juana, C., 1951. Introducción al estudio de la geología de Venezuela: Las formaciones del Eoceno en los Andes venezolanos y en la subcuenca del Lago de Maracaibo, *Bol. Geol. (Venezuela)*, 1(3): 265-287.

Salvador, A., 1950. Stratigraphy of the Chejendé region, Venezuela, *Ph. D. Thesis, Stanford University*.

Tash, G. E., 1937. Stratigraphy and paleontology of the Mene Grande and vicinity, *Bol. Geol. y Min. (Venezuela)*, 1(2-4): 159-172. (English ed.).

[Enviar Comentarios](#)

	
1a Edición LEV	Comentarios Recibidos

[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)