




CRETACICO (Albiense-Turonense)

Estado Táchira

Referencia original: W. Sievers, 1888, p.24.

Consideraciones históricas: Sievers (1888) introdujo el término caliza de Capacho para designar una sección de calizas del Cretáceo Medio expuesta cerca de Capacho (hoy Independencia), estado

Táchira, entre el tope de Aguardiente y la base de La Luna; Dalton (1912) las reconoció con el mismo nombre en otros estados de Venezuela occidental; Garner (1926) llamó Caliza de Río Cogollo al intervalo de calizas grises macizas cristalinas y fosilíferas que infrayace a la Luna. Liddle (1928) empleó el término "serie" Capacho en sentido mucho más amplio, pero posteriormente en 1946 lo descartó. Hedberg (1931) y otros usaron el nombre Cogollo para la Serie Capacho de Liddle; otros llamaron Cogollo a las calizas más superiores. Sutton (1946) eleva Cogollo a rango de grupo, dividido en las formaciones Apón, Aguardiente y Capacho. Bushman (1965) en Lara usa el término Capacho-La Luna por encontrar calizas tipo La Luna en Capacho; sin embargo, esto se presenta en la mayoría de las zonas de afloramientos de Capacho, como lo señala Rod (1959). Renz (1959) separa en Capacho los mismos miembros de la Formación Cogollo en la Concesión Barco de Colombia: Cogollo inferior, Cogollo medio y Guayacán; propone para los dos primeros los nombres La Grita y Seboruco, respectivamente. Sin embargo, Ramírez y Campos (1969), en base a observaciones de campo, prefieren la división de Sutton (1946) en un miembro inferior lutáceo y uno superior calcáreo, que se reconocen fácilmente en muchas secciones del flanco norte andino, especialmente el primero, expuesto en La Peña, carretera Zea-Panamericana. Renz (1959) propuso el nombre de Formación La Puya para designar calizas conchíferas, infrayacentes a las formaciones La Luna y Capacho, en los Andes; el mismo autor señala su estrecha semejanza con la Formación Maraca

Localidad tipo: El nombre proviene del cerro Capacho, al sur del pueblo del mismo nombre (hoy Independencia), estado Táchira, donde la estructura está fallada. Sutton (1946) menciona una sección de referencia situada en Río de Oro, Táchira septentrional.

Descripción litológica: Lutitas duras de color gris oscuro a negro, calizas duras de colores claros, frecuentemente fosilíferas, y ocasionales limolitas que se diferencian de las areniscas macizas de la Formación Aguardiente infrayacente y de las capas delgadas de calizas y lutitas negras de la Formación La Luna suprayacente. Las calizas de la Formación Capacho a menudo emiten fuerte olor a petróleo en superficies frescas. Renz (1959) reconoció y subdividió la Formación Capacho en tres miembros que de más antiguo a más joven denominó, La Grita, Seboruco, Guayacán.

El Miembro La Grita está constituido por calizas, Seboruco es esencialmente lutítico y en el Miembro Guayacán se presentan calizas bioclásticas de colores claros.

Ramírez y Campos (1969) es la región La Grita-San Cristóbal, estado Táchira divide a la formación en dos miembros. El miembro inferior consiste de lutitas negras mal laminadas y quebradizas, con ocasionales calizas gris claro de 20 a 30 cm de espesor; estas permiten diferenciar el miembro de la Formación Colón con la que se ha confundido en algunas secciones de Mérida. El miembro superior consiste de calizas grises muy fosilíferas que a veces son verdaderas coquinas, con pequeñas intercalaciones de lutitas negras. El espesor de las capas calcáreas no sobrepasa los 2 m y en la misma se presentan concreciones tipo La Luna. Los espesores observados no sobrepasan los 300 metros.

Una de las principales características de la unidad en la cuenca de Barinas es la recalcificación de las calizas coquinoideas de la parte superior de la formación, que afloran en el río Santo Domingo. Pierce (1960) indica que en la cuenca de Barinas no es posible subdividir la formación, como en otras áreas del occidente de Venezuela.

Según Kiser (1997, comentarios enviados al CIEN) Aguasuelos (1990) llaman erróneamente al intervalo "Formación Apón" en Barinas. En la quebrada Bellaca inferior, describen a calizas conchíferas (restos de ammonites y pelecípodos) a laminadas, localmente micríticas, localmente con concreciones de arenisca calcárea, intercaladas con algunas areniscas calcáreas y lutitas de color gris a gris oscuro y negro, calcáreas.

Espesor: Renz (1959) muestra numerosas secciones medidas en las cuales el espesor máximo es de 275 metros. Los espesores mayores mencionados por otros autores parecen incluir partes de las formaciones La Luna, Maraca y otras. Según Sutton (1946) los espesores de la Formación Capacho varían de 240 m en el río Omuquena a 310 m en Río de Oro (Táchira). En Trujillo se reportan 460 m aproximadamente, 223 m en río Cachirí; 400 m en Río Apón. En el flanco de Barinas, en la región de Barinas-Santo Domingo y área del río Boconó, Pierce (1960) describe 60 a 90 metros de la Formación Capacho, en los afloramientos de pie de monte indicando que no es posible subdividir la formación en miembros como ocurre en la depresión de Táchira-Tarra.

Según Renz (1959) da un espesor de 50 m al Miembro La Grita y 125 m al Miembro Guayacán en la región de Barinas, para un total de 175 m para la formación (Kiser, 1997 comentarios enviados al CIEN)

Extensión geográfica: Según Renz (1959) en los Andes, la formación Capacho está presente en todas las secciones al sur de una línea que corre aproximadamente desde Torondoy hasta Boconó, al este de la cual se considera transicional a la parte inferior de la Formación La Luna. En la parte nororiental de los Andes, desde el Alto de Tomón, pasando por Chejendé hasta llegar por Barbacoas, la facies y la litología de los sedimentos, que constituyen la continuación lateral de la Formación Capacho, han cambiado a tal extremo que Renz prefiere incluirlas en la Formación La Luna, debido a que el cambio en la litología es muy similar a la que se encontró entre la Formación Capacho del área del Río de Oro y la Formación La Luna del surco deposicional de Machiques. En Barinas, la formación se identifica desde el área Altamira-río Calderas-cerro Azul hacia el norte y noreste.

Hacia el sur, a lo largo de las colinas piemontinas surorientales de los Andes, la Formación Capacho pasa lateralmente a la arenosa Formación Escandalosa. Hacia el noroeste se extiende a la Concesión Barco en Colombia y a las áreas de Tarra y río de Oro, en Venezuela; más hacia el norte pasa por transición a la parte basal de La Luna en la depresión de Machiques.

La formación aflora también en el sector noreste de la cuenca de Barinas. Se trazan afloramientos excelentes en la faja de afloramientos del pie de monte en los ríos Santo Domingo, Calderas, Masparro y quebrada Bellaco, como también en el río Boconó.

Contactos: El contacto concordante con Aguardiente se fija con mucha precisión donde desaparecen las últimas capas de areniscas duras y aparecen las lutitas oscuras del miembro inferior de Capacho, contacto perfectamente visible (en la carretera Zea-panamericana). El contacto superior con la Formación La Luna es también concordante y claro (Ramírez y Campos, 1969).

El contacto inferior de la Formación Capacho es marcado sobre las calizas macizas de la Formación Maraca o sobre las areniscas macizas de la Formación Aguardiente; de igual naturaleza es el contacto superior con la Formación La Luna, pero ambos se consideran concordantes. Excepcionalmente pueden ser transicionales, especialmente en aquellos sitios donde las calizas de Maraca y Guayacán desaparecen de la secuencia (LEV, 1970).

La formación es transicional con la Formación Aguardiente infrayacente, y concordante con la Formación La Luna suprayacente, a través de la cuenca de Barinas (Pierce, 1960).

Fósiles: En la parte inferior se señalan foraminíferos planctónicos del grupo *Rotalipora* (*Ticinella*, *Thalmaninella*), y cerca del tope, amonites que incluyen el género *Coilopoceras*.

Las faunas características de Capacho, mencionadas por Sutton (1946), son especies de *Plicatula*, *Exogyra*, *Trigonia*, *Cardita* y *Ostrea*. Notestein *et al.* citan los siguientes fósiles de Cogollo en la Concesión Barco: *Cardita subparalela* Gerhardt, *Cyprimeria* sp., *Poromya* sp., *Plicatula "maraensis"*, *Carbula* sp., *Gryphaca* sp., *Inoceramus* sp., *Trigonia* sp. En la parte inferior de la unidad al sur de Carora se reconoce *Mariella bergeri* (Brongn). Aguasuelos (1990, en Kiser 1997) reportan, de lutitas negras del río Calderas, a *Birostrina concentrica* (un *Inoceramidea*) y, en el río Santo Domingo, los bivalvos *Plicatula inflata* y *Inoperna flabellata*, y los gasterópodos *Tylostoma mutabilis* y *Coninoda mammata*. Sin poder extraerlas de la caliza, identificaron a los moluscos *Mediterraneotrigonia hondaana tuberosa*, *Pseudomelania albensis* y *Cimolithium* sp.

Edad: Cretácico, Cenomaniense Superior a Turoniense Superior. Un conjunto de amonites recogidos en Barbacoas indican una edad Albiense Medio o Turoniense (Ramírez y Campos, *op. cit.*). Según Aguasuelos (1990 en Kiser, 1997) los macrofósiles indican una edad Albiense Medio a Tardío.

Correlación: La Formación Capacho se correlaciona en su parte superior con la Formación Maraca de Rod y Maync (1954). Es correlativa de la Capacho del Táchira y de otras áreas en Mérida y Trujillo y equivalente por lo menos a la parte inferior de la Formación Navay del suroeste de los Andes merideños y de la región cubierta por los

llanos (Pierce, 1960). Es equivalente lateral en tiempo con la Formación La Luna de Perijá y la parte basal es muy similar litológicamente a la Formación La Luna.

Paleoambientes: Según Ramírez y Campos (1969) las lutitas negras de la base indican el avance de la transgresión y la profundización de la cuenca; las calizas superiores indican condiciones sedimentarias uniformes en toda la cuenca.

Aguasuelos (1990 en Kiser, 1997) interpretan un ambiente de plataforma interna, con aguas entre 10 y 70 m de profundidad.

© *V. Savian, 1997*

Referencias

Bushman, J. R., 1965. Geología del área de Barquisimeto, Venezuela. *Bol. Geol.*, Caracas, 6(11): 3-111.

Dalton, L. V., 1912. Venezuela. *The South American series. London*, 320 p.

Dalton, L. V., 1912. On the geology of Venezuela. *Geol. Mag.* (London), 9(575): 203-210.

Garner, A. H., 1926. Suggested nomenclature and correlation of geological formations in Venezuela. *Amer. Inst. Min. Metall. Eng., Trans.*: 677-684.

Hedberg, H. D., 1931. Cretaceous limestones as petroleum source rocks in northwestern Venezuela. *Amer. Assoc. Petrol. Geol., Bull.*, 15(3): 229-244.

Kiser, G. D., 1997. Nuevas contribuciones a la geología de Barinas-Apure y su frente de montañas. En prensa.

Liddle, R. A., 1928. *The geology of Venezuela and Trinidad*. J. P. MacGowan, Forth Worth, Texas, 525 p.

Ministerio de Minas e Hidrocarburos, 1970. Léxico Estratigráfico de Venezuela. *Bol. Geol. Pub. Esp.* N°4. 756 p.

Pierce, G. R., 1960. Geología de la Cuenca de Barinas. *III Cong. Geol. Ven.*, 1: 212-276.

Ramírez, C. y V. Campos, 1969. Geología de la región de La Grita-San Cristóbal, estado Táchira, *IV Cong. Geol. Venez.*, 2: 861-897.

Renz, O., 1959. Estratigrafía del Cretáceo en Venezuela occidental. *Bol. Geol.* 5(10): 3-48. Resumen (1960) en: *Asoc. Geol., Min. y Petról.*, Bol. Inform., 3(7): 209 p.

Rod, E., 1959. Formación Capacho en Trujillo septentrional y en Lara suroriental. *Bol. Geol.*, Caracas, 5(10): 49-66.

Rod, E. and Maync, W., 1954. Revision of lower Cretaceous stratigraphy of Venezuela. *Amer. Assoc. Petrol. Geol., Bull.*, 38(2): 193-283.

Sievers, W., 1888. Die Kordillere von Mérida nebst Bemerkungen über der Karibische Gebirge. *Geogr. Abhandl.* (Penck), 3(1): 238.

Sutton, F. A., 1946. Geology of Maracaibo basin, Venezuela. *Am. Assoc. Geol., Bull.*, 30: 1621-1741.

Bibliografía de Léxicos Anteriores

Bushman, J. R., 1959. Geology of the Barquisimeto area- A summary report. *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról.*, Bol. Inform., 2(4): 65-84.

Liddle, R. A., 1946. *The Geology of Venezuela and Trinidad*, 2nd ed., Paleont. Res. Ithaca, N. Y., 890 p.

Notestein, F. B., Hubman, C. W., and Bowler, J. W., 1944. Geology of the Barco Concession, Republic of Colombia, South America. *Geol. Soc. Amer., Bull.*, 55(9): 1165-1216.

Salvador, A., 1961. Guidebook to the geology of northeastern Trujillo. *Soc. Geol. Venez. Occid.*, Guidebook (3): 33 p.

Smith, J. W., 1951. The Cretaceous limestone producing areas of the Mara and Maracaibo Districts, Venezuela, *3rd. World Petrol. Cong., Pr.*, sec. I, (geology), p. 56-71.

Staff of Caribbean Petroleum Company, 1948. Oil fields of Royal Dutch-Shell group in western Venezuela, *Am. Assoc. Geol., Bull.*, 32(4): 517-628.

Enviar Comentarios

		
2a Edicion LEV	1st Ed. English	Comentarios Recibidos



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)