




TERCIARIO (Mioceno Temprano)

Estado Anzoátegui

Referencia original: H. D. Hedberg y A. Pyre, 1944, p. 23.

Consideraciones históricas: Hedberg y Pyre (1944) introdujeron el nombre Capiricual como miembro del "grupo Santa Inés" para designar una secuencia gruesa y monótona de sedimentos de aguas salobres a marino someros que descansan sobre la Formación Naricual y gradan hacia arriba a la esencialmente no-marina Formación Quiamare, al oeste del área río Querecual-quebrada Carapita. Hedberg (1950, p. 1201) elevó la secuencia al rango de formación.

Localidad tipo: Hedberg y Pyre (*op. cit.*) escogieron la sección tipo en la carretera Puerto La Cruz-Oficina desde el kilómetro-22 en el declive norte del cerro Grande hasta la cresta del cerro Boca Tigre, en el kilómetro 36,5, una distancia de unos 14,5 km. Aunque no publicado, el nombre probablemente proviene del río Capiricual.

Descripción litológica: La formación se caracteriza por interestratificaciones de lutitas, areniscas y conglomerados, con algunos lignitos y arcilitas moteadas, principalmente en la parte inferior. Las areniscas, en capas de 3-10 m de espesor, son de color gris marronusco, gris verdoso, gris verdoso- marronusco y "sal y pimienta"; endurecidas, comúnmente calcáreas, con estratificación cruzada y escasas estructuras de "corte y relleno". Son finamente laminadas, de grano fino a medio, con lentes y láminas de conglomerado negro ftanítico que aumentan hacia el oeste. Las lutitas y lutitas arenosas (80% de la formación) son grises o gris marronuscas, micáceas, carbonáceas, con lamina de nódulos elipsoidales de arcilita siderítica ("clay-ironstone"). El yeso y jarosita son elementos comunes; lignitos y carbones delgados ocurren localmente en las areniscas.

Espesor: Los autores del nombre indican un espesor de unos 3.660 m en la sección tipo. Peirson (1965-a) reportó un espesor mínimo de 2.341 m y un máximo (exagerado?) de 5.400 m en la sección tipo; en el área del río Querecual-quebrada Peña, reportó 2.704 m. Afirmó que la formación tiene su mayor espesor entre la quebrada Carapita y el pozo Quiamare-3, y que se adelgaza desde aquí, al noroeste y oeste.

Extensión geográfica: Hacia el oeste, desaparece por debajo de la planicie costera al sur y oeste de Barcelona; lutitas de la Formación Carapita aparecen en el medio de Capiricual hacia el este, y la reemplazan rápidamente en esa dirección, con excepción de las lenguas basales y superiores, llamadas Capaya y Uchirito, respectivamente, las cuales se proyectan un poco mas al este del río Querecual. Según Peirson (1965-a, p. 26), la Formación Capiricual aflora en una sola banda con 4-6 km de ancho, desde el oeste de un límite vertical arbitrario, en donde se acuñan las lutitas de la Formación Carapita, al oeste de la quebrada Peña, hacia el oeste por unos 29 km, hasta que se desaparece por debajo de los aluviones de la depresión de Barcelona.

Expresión topográfica: Las areniscas y conglomerados forman colinas y crestas de buzamiento fácilmente trazadas en las fotografías aéreas.

Contactos: La Formación Capiricual grada rápidamente en su base, vertical y lateralmente, a las Formaciones Naricual y Carapita. Generalmente, se ubica el contacto con Naricual en donde las areniscas ftaníticas de Capiricual se reemplazan hacia abajo con las areniscas limpias de color claro de Naricual. Es transicional vertical y lateralmente con la Formación Quiamare suprayacente; el contacto se ubica en el cambio de los sedimentos salobres a marinos someros de Capiricual a las arcillas, limolitas, areniscas y conglomerados continentales de la Formación Quiamare.

Fósiles: Stainforth (*vide* Peirson, 1965-a, p. 30) identificó, en Capiricual inferior, a *Bathysiphon* sp. y, a través de toda la formación, la Zónula *Robulus-Eponides*, con *R. subaculeatus* var. *glabratus*, *R. americanus*, *R. dicampylus*, *E. byramensis*. *Elphidium* sp., cf. *E. sagrai*, *Discorbis subaraucana* var. *dissons*, mas las géneros de *Eponides*, *Bolivina*, *Cibicides*, *Textularia*, *Eggerella*, *Verneuilina*, *Cyclammina*, *Arenobulumina*, *Ammobaculites* y *Ammomarginulina*. También, identificó algunos planctónicos como *Globigerinoides triloba* y escasas *Globoquadrina quadraria* y *G. altispira*. Citó a Lamb, quien identificó, en el pozo QG-3 (a 5565' y 8500'), a *Globigerinoides bisphericus* y *Globigerinita incrusta*. Mencionó algunas niveles arenosos con pequeñas

pelecípodos, gasterópodos, espículas de equinodermos, dientes de peces y niveles lutíticos con impresiones de plantas.

Edad: Peirson (1965-a) opinó que la formación "probablemente cae totalmente dentro del Mioceno Temprano..... inferido mas bien de evidencia negativa y posición estratigráfica." Este autor ubicó la formación en las zonas *G. incrusta*-*G. insueta*, llegando, posiblemente, a las zonas *C. dissimilis* y *G. fohsi*.

Correlación: Hedberg y Pyre (1944) correlacionaron Capiricual como equivalente lateral del conjunto Capaya-Carapita-Uchirito. Hacia el sur y sureste, pasa a la Formación Oficina, "arenas" F-8 a U-1, según De Sisto (1960-a).

Paleoambientes: Peirson (1965-a) interpretó un ambiente marino somero a salobre con una fuente de sedimentos al norte.

Véase [QUIAMARE, Formación](#); [CARAPITA, Formación](#); [CAPAYA, Formación](#); [UCHIRITO, Formación](#) y [NARICUAL, Formación](#).

© **G. D. Kiser, 1997**

Referencias

Hedberg, H. D., 1950. Geology of the Eastern Venezuela Basin (Anzoátegui-Monagas-Sucre-eastern Guárico portion). *Bull., Geol. Soc. Amer.* 61(11): 1173-1215.

Hedberg, H. D. y A. Pyre, 1944. Stratigraphy of northeastern Anzoátegui, Venezuela. *Bull. American Assoc. Petr. Geol.*, 28(1): 1-128.

Peirson III, A. L., 1965-a. Geology of north-central Venezuela. *Informe inédito*, Creole Petr. Corp., Corpoven: 337 p.

Bibliografía de Léxicos Anteriores

De Sisto, J.-1960-a. Correlation of the Santa Inés Group in northeastern Anzoátegui. *Bol. Inform., Asoc. Venez. Geol. Min. y Petr.*, Caracas, 3(5): 138-143 y 144-146.

Hedberg, H. D., 1950. Geology of the eastern Venezuela basin (Anzoátegui-Monagas Sucre-eastern Guárico portion), *Geol. Soc. Am., Bull.*, 61(11): 1173-1216.

Hedberg, H. D. and A. Pyre, 1944. Stratigraphy of northeastern Venezuela, *Am. Assoc. Petrol. Geol.*, *Bull.*, 28(1): 1-28.

Salvador, A., 1964-b. Proposed simplification of the stratigraphic nomenclature in eastern Venezuela. *Bol. Inform., Asoc. Venez. Geol. Min. y Petr.*, 7(6): 153-202.

Enviar Comentarios

		
2a Edicion LEV	1st Ed. English	Comentarios Recibidos



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)