

**PRECAMBRICO**

Estado Bolívar

**Referencia original:** J. Martínez, 1985, p. 69.

**Consideraciones históricas:** Martínez (1985) designa con este nombre a un conjunto de rocas de carácter muy complejo que ocupan la Penillanura de Casiquiare, localizada en la región sur-occidental del estado Amazonas. Incluye dentro del Complejo: cuarzo-monzonitas, tonalitas, gneises mórificas, granodioritas, trondhjenitas, migmatitas, rocas gabroides y anfibolitas. Predominan las direcciones estructurales N50-60 W y E-W. No se observaron en el área relaciones de campo entre los diferentes tipos litológicos.

Rivas (1985) lo describe en el área de San Fernando de Atabapo y aflora en el río Atabapo y en sus afluentes Cumare y Ucakem. Incluye dentro del Complejo rocas similares a las descritas por Martínez (*op. cit.*) e incluye además del Granito de Atabapo, las Migmatitas de Minicia, dioritas, rocas gabroides y gneises félsicos. En esta área las direcciones estructurales predominantes son similares a las encontradas en el valle del Casiquiare. Las rocas del Complejo muestran un grado de metamorfismo correspondiente a la facies epidoto-cordienira-anfibolita.

La zona es de un potencial geoeconómico importante, las rocas graníticas son posibles fuentes de estaño, tantalita, columbita, molibdeno, zirconio, torio y uranio. La diorita es posiblemente portadora de cobre, plomo, zinc, molibdeno y oro.

En el Granito de Atabapo se determinó una edad de 2000 m.a. por el método Rb/Sr roca total isocrona, lo cual sugiere una edad Precámbrico Inferior para el Complejo.

Yáñez *et al.* (1985), Martínez y Martínez (1992), Martínez *et al.* (1992) y Rincón y Zerpa (1992), en el marco del Proyecto Inventario de los Recursos naturales Renovables de la Región Guayana (P.I.R.N.R.G.), realizaron estudios geológicos de campo y describieron con cierto detalle características litológicas y geomorfológicas de tipos de rocas que constituyen este Complejo y que afloran en un extenso sector comprendido entre los ríos Guainía, Río Negro, Brazo Casiquiare, Pasimoni y sus afluentes Yatua y Varia y Ocamo, dentro del cual están localizados los poblados de San Carlos de Río Negro y San Simón de Cucuy (anteriormente Piedra del Cucuy).

El término se considera informal debido a lo incompleto de la definición original y a que las descripciones dadas en el marco del proyecto P.I.R.N.R.G., son referidas en su mayoría a unidades litológicas que siguen una identificación establecida internamente en el Proyecto.

© J. H. Rios, 1997

**Referencias**

Martínez, F. y R. Martínez, 1992. Reconocimiento geológico y geomorfológico del área río Cunucunuma-Duida, Territorio Federal Amazonas, Venezuela. *Bol. Soc. Ven. de Geólogos*, 44:47-61.

Martínez F., W. Zerpa y L. Esis, 1992. Geología y geomorfología del sector Boca de Ocamo-Salto Guaharibo, Alto Orinoco, Territorio Federal Amazonas, Venezuela. *Bol. Soc. Ven. de Geólogos*, 44: 31-41.

Martínez, J., 1985. Geología de la sub-región de San Carlos de Río Negro, Territorio Federal Amazonas, Venezuela. *I Simp. Amazónico*, Puerto Ayacucho 1981. Ministerio de Energía y Minas, Dir. de Geología, Public. Esp. 10: 65-71.

Rincón, H. y W. Zerpa, 1992. Estudio geológico- geomorfológico del sector ríos Pasimoni, Yatúa y Varia, Territorio Federal Amazonas, Venezuela. *Bol. Soc. Ven. de Geólogos*, 44: 22-30.

Yáñez, G., I. Marcano, E. Lugo y N. Rivero, 1992. Geología y geomorfología de la frontera con Colombia, entre la Piedra del Cocuy y Maroa, al sroeste del Territorio Federal Amazonas, Venezuela. *Bol. Soc. Ven. de Geólogos*, 44: 15-21.

Enviar Comentarios



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)