


**MESOZOICO**

Estado Aragua

Referencia original: R. Shagam, 1960, P. 605.

Consideraciones históricas: Con este nombre Shagam (1960) describió a un conjunto de metalavas máficas interestratificadas con rocas metasedimentarias y otros tipos de rocas metavolcánicas, ubicándola entre sus formaciones El Chino y Santa Isabel. Oxburgh (1965), Konigsmark (1966), Jarvis (1966) y Piburn (1968) completan la descripción y la extienden su cartografía. Seiders (1965) y Urbani *et al.* (1990) no reconocen esta unidad en Miranda central (Santa Teresa - Guatopo) por la escasez de metalavas. Navarro (1983) presenta un estudio geoquímico y petrográfico detallado y la correlaciona con su [Unidad de Metalavas](#). Girard (1981) y Beets *et al.* (1984) aportan nueva información petrológica y geoquímica.

Localidad tipo: Hacienda El Carmen, distrito Zamora del estado Aragua. Hoja 6746, escala 1:100.000, Cartografía Nacional.

Descripción litológica: Shagam (1960) en su descripción original señala metalava basáltica espilitica de color verde - azulado, sub-maciza a esquistosa con grandes fenocristales de augita de color verde aceituna, así como albita, actinolita y plagioclasa sausrinizada. Navarro (1983) al describir su Unidad de Metalavas señala que la metalava piroxénica se caracteriza por la presencia de fenocristales de piroxeno (augita diopsídica) en una matriz constituida principalmente por microlitos de plagioclasa o de sus productos de la transformación metamórfica (lawsonita, pumpellitita, epidoto). Dicha matriz presenta en muchos casos, textura de flujo y afieltrada. Intercalándose con la metalava hay granofel, metaftanita, filita grafitosa y metatoba, que mayormente es de cenizas, aunque localmente pueden presentarse fragmentos líticos que en algunos caso pueden alcanzar el 50% del total de la roca. Las asociaciones mineralógicas indican que esta unidad estuvo sometida a condiciones metamórficas de las zonas de la lawsonita - glaucofano y epidoto - (zoicita/clinozoicita) - glaucofano. Según Navarro *et al.* (1987, 1988) las rocas volcánicas almohadilladas e intercaladas con metasedimentos pelágicos (como las que afloran en el río Pao, al oeste de Santa Rosa, Aragua) deben asignarse a una secuencia ofiolítica equivalente a la Formación El Carmen.

Espesor: Piburn (1968) estimó un espesor de 1.200 m.

Extensión geográfica: La unidad aflora desde Aragua central, hasta el sur de Carabobo y norte de Guárico.

Geoquímica y paleoambiente: Según Navarro (1983) y Navarro *et al.* (1987, 1988) las lavas corresponden a basaltos de cadenas centro oceánicas (MORB). Ostos (1990) indica que los metabasaltos tienen afinidad tholeítica, habiéndose formado probablemente en un borde divergente de placas. El contenido de elementos de la tierras raras y los patrones de distribución de otros elementos, no aportan información inequívoca, pero no es inconsistente con un magmatismo de cuencas oceánicas profundas.

Contactos: Han sido descritos como concordantes (y transicionales) con las formaciones El Chino y Santa Isabel, adyacentes.

Fósiles: No se han encontrado.

Edad: Loubet *et al.* (1985) presentan nueve edades K/Ar de metalavas del Grupo Villa de Cura (mayoritariamente de la Formación El Carmen), con valores que van desde 77 a 107 m.a. (Cretácico).

Correlación: No se ha establecido con otras unidades de la Cordillera de la Costa.

Sinonimia: Unidad de Metalavas de Navarro (1983).

Véase [VILLA DE CURA, Grupo](#).

Referencias

Beets, D. J., W. Maresch, G. T. Klaver, A. Mottana, R. Bocchio, F. Beunk y H. Monen. 1984. Magmatic rock series and high-pressure metamorphism and constraints on the tectonic history of the Southern Caribbean. En: W. E. Bonini, R. B. Hargraves y R. Shagam (Eds.) *The Caribbean South America plate boundary and regional tectonics. Geol. Soc. America, Memoir 162*, p. 95-130.

Konigsmark, T. A. 1965. Geología del área de Guárico septentrional - Lago de Valencia, Venezuela. *Bol. Geol.*, Caracas, 6(11): 209-285.

Loubet, M., B. Montigny, B. Chachati, N. Duarte, B. Lambert, C. Martín y M. Thuizat. 1985. Geochemical and geochronological constraints on the geodynamical development of the Caribbean chain of Venezuela. En: A. Masce (Ed.), *Symposium Geodynamique des Caraïbes*, Edit. Technip, París, 1: 553-566.

Navarro, E. 1983. Petrología y petrogénesis de las rocas metavolcánicas del Grupo Villa de Cura. *Geos*, UCV, Caracas, 28: 170-317.

Navarro, E., M. Ostos y F. Yoris. 1987. Revisión y redefinición de las formaciones: El Carmen, Santa Isabel, El Chino, El Caño, Escorzonera y Garrapata, Venezuela Norte Central. *Iras. Jornadas de Investigación en Ingeniería*, UCV, Caracas, Memorias, p. 64-70.

Navarro, E., M. Ostos y F. Yoris. 1988. Revisión y redefinición de unidades litoestratigráficas y síntesis de un modelo tectónico para la evolución de la parte Norte - Central de Venezuela durante el Jurásico medio - Paleogeno. *Acta Científica Venezolana*, 39: 427-436.

Ostos, M. 1990. Evolución tectónica del margen sur-central del caribe basado en datos geoquímicos. *Geos*, UCV, Caracas, (30): 1-294.

Oxburgh, E. R. 1965. Geología de la región del estado Carabobo, Venezuela. *Bol. Geol.*, Caracas, 11: 113-208.

Piburn, M. D. 1968. Metamorfismo y estructura del grupo Villa de Cura, norte de Venezuela. *Bol. Geol.*, Caracas, 9(18): 183-290.

Shagam, R. 1960. Geología de Aragua central (Venezuela). *Bol. Geol.*, Caracas, Public. Esp. N° 3, 2: 574-675. Versión en inglés: Geology of central Aragua, Venezuela. *Geol. Soc. Amer. Bull.*, 71(3): 249-302.

Seiders, V. M. 1965. Geología de Miranda central, Venezuela. *Bol. Geol.*, Caracas, 6(12): 289-416.

Urbani, F., A. Chirinos y M. Marquina. 1990. Geología del área de Guatopo - El Guapo. Estado Miranda y Guárico. Parte 1: Grupo Villa de Cura. *Revista de la Facultad de Ingeniería*, UCV, Caracas, 5(1): 96-124.

Bibliografía de Léxicos Anteriores

Aguerrevere, P. I. y G. Zuloaga, 1937-a. Observaciones geológicas en la parte central de la Cordillera de la Costa, Venezuela. *Bol. Geol y Min.*, Caracas, 1(2-4): 3-22.

Aguerrevere, P. I. y G. Zuloaga, 1937-b. Geological notes on the central part of the Cordillera de la Costa, Venezuela. *Bol. Geol. y Min.*, Caracas, 1(2-4): 3-22 (ed. en inglés).

Aguerrevere, P. I. y G. Zuloaga, 1938-a. Nomenclatura de las formaciones de la parte central de la Cordillera de la Costa. *Bol. Geol. y Min.*, Caracas, 2(2-4): 281-284.

Aguerrevere, P. I. y G. Zuloaga, 1938-b. Nomenclature of the formation of the central part of the Cordillera de la Costa. *Bol. Geol. y Min.*, Caracas, 2(2-4): 257-260 (ed. en inglés).

Bell, J. S., 1968-a. The Garrapata Formation of the Venezuelan Coast Ranges. *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról.*, Bol. Inform., 11(7): 187-206.

Bell, J. S., 1968-b. Geología del área de Camatagua, Estado Aragua, Venezuela. *Bol. Geol.*, Caracas, 9(18): 291-440.

Feo Codecido, G., 1962. Contribución a la geología de Venezuela nor-central. *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról.*, Bol. Inform., 5(5): 119-142.

Jarvis, Jr., H. A., 1966. Geología de la región de río Pao - río Tiznados, Estados Cojedes y Guárico, Venezuela. *Bol. Geol.*, Caracas, 8(15): 73-115.

Menéndez, V. de V. A., 1965. Geología del área de El Tinaco, centro norte del Estado Cojedes, Venezuela. *Bol. Geol.*, Caracas, 6(12): 417-543.

Smith, R. J., 1952. Geología de la región Los Teques-Cúa. *Bol. Geol.*, 2(6): 333-406.

Enviar Comentarios



2a Edición LEV



Comentarios Recibidos



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)