




CRETACICO (Temprano a medio)

Estado Guárico

Referencia original: Shagam, 1960.

Consideraciones históricas: El término El Chacao fue empleado originalmente por Shagam (1960), para designar una masa intrusiva ultrabásica dentro del Grupo Villa de Cura, en Aragua central, a la cual describió someramente. Konigsmark (1965) mencionó la unidad como complejo ultramáfico, y describió secciones finas de varias muestras. Murray (1973) presentó un estudio muy detallado de la unidad, describiéndola como un complejo zonado. Hebeda *et al.* (1984) y Loubet *et al.* (1985), publicaron resultados de análisis radiométricos de la edad de la unidad.

Localidad tipo: Hacienda El Chacao, a unos 8 km al oeste de San Juan de los Morros, distrito del estado Guárico. (Hoja 6745, esc. 1:100.000, Cartografía Nacional).

Descripción litológica: La masa principal del Complejo de El Chacao está constituida por hornablendita, dentro de la cual se encuentran cuerpos separados de piroxenita olivínica y gabro hornabléndico.

La hornablendita forma la mayor parte de los afloramientos del complejo. Es una roca de color negro verdoso, de grano grueso, conteniendo hasta un 90% de hornablenda en forma de prismas alargadas a amuñonadas. Contiene además, hasta un 10% de magnetita, biotita accesoria y sulfuros diseminados (pirita). En algunos casos, se presenta una gradación a hornablendita feldespática, con los cristales de feldespatos intercalados con los de hornablenda, o formando parches.

La piroxenita olivínica se presenta como cuerpos discretos dentro del complejo, estando los dos más extensos en la porción norte del mismo. Es una roca verde grisácea, maciza y densa, formada por un 80% de clinopiroxeno en prismas tabulares, y un 20% de olivino en forma de mosaicos anhedrales, e inclusiones en el clinopiroxeno. El olivino frecuentemente está serpentinizado.

Las masas de piroxenita olivínica gradan a la hornablendita, formando piroxenita hornabléndica y hornablendita piroxénica, según las proporciones relativas de piroxeno u hornablenda.

El gabro hornabléndico forma masas separadas en los bordes y dentro del complejo, estando la más extensa en el extremo sur-este. La composición general de los gabros consisten en 60% de feldespato (plagioclasa zonada) y un 40% de hornablenda. Al aumentar el contenido de hornablenda, la roca pasa a hornablendita feldespática (más del 70% de hornablenda). En los afloramientos se observa un conspicuo bandeamiento, por la concentración de elementos oscuros y claros en bandas alternas.

Ambiente tectónico y petrogénesis: Ninguna.

Contactos: Los afloramientos del Complejo de El Chacao se presentan en un cuerpo alargado de norte a sur, de unos 8 km de largo, por 6 de ancho, dividido longitudinalmente por una faja de unos 700 m de ancho, donde afloran rocas de la Formación Santa Isabel del Grupo Villa de Cura; el complejo es intrusivo dentro de las rocas de Villa de Cura, está bordeado por una aureola de metamorfismo de contacto, cuya anchura e intensidad, son variables, dependiendo de la composición de la roca caja y del tipo de roca intrusiva. En general, tanto la anchura de la aureola y la intensidad del metamorfismo, son mayores en el contacto con la hornablendita, llegando la anchura hasta unos 300 m. Según Murray (*op. cit.*), los conjuntos mineralógicos hallados en las rocas metamórficas de contacto, son típicos de la facies del hornfels piroxénico.

Extensión geográfica: El complejo aflora, según Murray (*op. cit.*), en una faja de intrusiones ultramáficas, que se extiende por unos 350 km a lo largo del borde meridional de la Cordillera de la Costa, desde Altagracia de Orituco, hasta Acarigua.

Edad: Murray (*op. cit.*) sugirió una edad precretácico medio, en base a estratigráficas. Loubet *et al.* (*op. cit.*) determinaron la edad K/Ar en cuatro muestras de hornoblenda, obteniendo valores de $91 \pm 3,5$ m.a. a 104 ± 4 m.a.

Hebeda *et al.* (1984) determinaron también la edaa K/Ar de tres hornblendas de las muestras colectadas por Murray, y obtuvieron edades de 97.2 ± 3.5 , hasta 106.6 ± 3.5 m.a. Estas edades corresponden al Albiense tardío-Cenomaniense.

Correlación: El Complejo de El Chacao puede correlacionarse con el Complejo de Cerro Pelón, cerca de Acarigua, y a otros cuerpos ultramáficos de menor extensión que intrusionan el Complejo de El Tinaco, a lo largo del borde meridional de la Cordillera de la Costa.

© *P. Jam L., 1997*

Referencias

Hebeda *et al.*, 1984. ???

Koningsmark, T. A., 1965. Geología del área de Guárico septentrional-Lago de Valencia, Venezuela. *Bol. Geol.*, Caracas, 6(11): 209-285.

Loubet *et al.*, 1985. ???????????????????????????????????????

Murray, C., 1973. Estudios petrográficos de complejos ultramáficos zonados en Venezuela y Alaska, *Bol. Geol.*, Caracas, 12(22): 173-279.

Shagam, R., 1960-a. Geología de Aragua central (Venezuela). *III Cong. Geol. Venez.*, Caracas, 1959, 2: 574-675.

Shagam, R., 1960-b. Geology of central Aragua, Venezuela. *Geol. Soc. Amer.*, Bull., 71(3): 249-302.

Enviar Comentarios



Comentarios
Recibidos



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)