




NEOGENO (Plioceno Temprano a Tardío)

Estado Falcón

Referencia original: C. González de Juana, 1937-a, p. 202.

Consideraciones históricas: González de Juana (1937) publicó el nombre de "paquetes de El Veral", simultáneamente con Suter (1937), quien empleó el nombre de "capas de El Veral" para designar unas capas de calizas arenosas, limolíticas y conglomeráticas expuestas en la Fila El Veral, al sureste de Puerto Cumarebo. Suter (1937) consideró este intervalo como la parte inferior de la formación Punta Gavilán; González de Juana (1937) consideró el paquete El Veral, como equivalente del Miembro Curazaíta de la Formación La Vela. Payne (1951) empleó el nombre Formación El Veral, propuso la sección tipo y describió la litología y los contactos de la unidad. Mencher *et al.* (1951, Cuadro de Correlación) y Weingeist (LEV I, 1956) la consideraron equivalente de la Formación La Vela.

Díaz de Gamero (1968) estudió los moluscos y foraminíferos de la formación. Giffuni (1980) estudió la unidad en el área de Tocópero. Giffuni *et al.* (1992) presentan un estudio de la estratigrafía secuencial de la formación. Díaz de Gamero *et al.* (1994) precisan datos de la unidad.

Localidad tipo: Extremo occidental de la Fila El Veral, a unos 500 m al norte del campo Cumarebo, distrito Zamora, estado Falcón. Hoja 6350 escala 1:100.000, Cartografía Nacional.

Descripción litológica: Consiste de arcillas glauconíticas intercaladas con calizas detríticas, con granos de cuarzo y ftanita; algunas intercalaciones de arcilla contienen foraminíferos. Localmente presenta una capa basal con cantos de calizas, areniscas y ftanitas (Payne, 1951). En el río Cumarebo la unidad consiste de arcillas grises microfósilíferas y margas de color marrón, fósilíferas, interestratificadas con areniscas color marrón, con fragmentos de conchas (Díaz de Gamero, 1968). En la región de Tocópero, la Formación El Veral consiste de arcillas marrones, masivas, calcáreas y fósilíferas, interestratificadas con calizas bioclásticas marrones y margas fósilíferas marrón rojizo. Hacia la parte media de la unidad, se destacan dos cuerpos importantes de calizas algales, de 70 m de espesor (Giffuni, 1980).

Espesor: En la fila El Veral, la unidad tiene unos 210 m, al oeste de esta localidad aumenta de espesor; al este de campo Cumarebo alcanza unos 360 m; en el río Cumarebo, Díaz de Gamero (1968) midió, igualmente, 360 m. Giffuni *et al.* (1992) indican un espesor de 661 m en la región de Tocópero.

Extensión geográfica: La unidad se reconoce desde el extremo occidental de la Fila El Veral hasta la región de Tocópero, al este del campo de Cumarebo.

Contactos: Payne (1951) considera que el contacto basal es discordante con la Formación Caujarao. Giffuni (1980) y Giffuni *et al.* (1992) lo consideran concordante sobre la Formación Caujarao. Díaz de Gamero *et al.* (1997) colocan el contacto inferior concordante con la Formación Turupía. El contacto superior es discordante con la Formación Tucupido.

Fósiles: Díaz de Gamero (1968) identificó el contenido faunal de las lutitas y margas de la Formación El Veral y, en orden de abundancia, menciona foraminíferos planctónicos, bénticos y moluscos mal preservados. Presenta una extensa lista de foraminíferos y su distribución, así como también de los moluscos de la formación en el río Cumarebo. Giffuni (1980) presenta extensa información acerca de los foraminíferos en el área de Tocópero.

Edad: La edad asignada por Díaz de Gamero (1968) es de Mioceno Tardío, pero estudios posteriores modifican esta interpretación. Giffuni *et al.* (1992) y Díaz de Gamero *et al.* (1994) le asignan una edad Pliocena, de Zona de *Globorotalia margaritae* a Zona de *Globorotalia miocenica* en base a foraminíferos planctónicos y Zona de *Reticulofenestra pseudoumbilica* (NN15) en base a nannoplancton calcáreo.

Correlación: La Formación El Veral siempre ha sido considerada como correlativa, incluso continuación lateral, de la Formación La Vela. Sin embargo, las últimas determinaciones de edad la hacen correlativa parcial de solo la parte superior de la Formación La Vela.

Paleoambientes: Giffuni *et al.* (1992) consideran que la Formación El Veral se sedimentó sobre la plataforma media y externa. Inicialmente, se trata de depósitos de margen de plataforma, transgresivos hacia arriba (TR/SMW). Siguen depósitos de subida relativa del nivel del mar (HST), terminando en un contacto superior discordante, correspondiente al límite de secuencia SB=3,8 Ma.

© **E. Cabrera, 1997**

(Actualizado por: María Lourdes Díaz de Gamero, agosto 1997)

Referencias

Díaz de Gamero, M., 1968. Paleontología de la Formación El Veral (Mioceno), Estado Falcón. *Geos* 17:7-51.

Díaz de Gamero, M. L., G. Giffuni y M. Castro Mora, 1994. Las formaciones Caujarao y El Veral al este de Cumarebo, Falcón nororiental, Venezuela (Resumen) *V Simp. Bolivariano Explor. Petrol. Cuencas Subandinas*, Mem.: 237-239.

Díaz de Gamero, M. L., G. Giffuni y M. Castro Mora, 1997. Las formaciones Caujarao y Turupía al este de Cumarebo, Falcón nororiental, *Sociedad Venezolana de Geólogos*, Bol., 22(1).

Giffuni, G., 1980. Geología del área de Tocópero y su relación con la cuenca de Agua Salada, estado Falcón, *Trabajo Especial de Grado, Universidad Central de Venezuela*, 245 p., Inédito.

Giffuni, G., M. L. Díaz de Gamero y M. Castro Mora, 1992. Análisis secuencial del Neógeno de la región de Cumarebo, Falcón nororiental, basado en estudios bioestratigráficos, *Soc. Venez. Geol.*, Bol., 46: 7-15.

González de Juana, C., 1937. Geología General y Estratigrafía de la Región de Cumarebo, Estado Falcón. *Bol. Geol. y Min.*, 1(2-4): 195-218.

Mencher E., K. F. Dallmus; H. J. Fichter; C. González de Juana; R. L. Ponte; H. H. Renz y P. Schumacher, 1951. Cuadro de correlación de las formaciones geológicas de Venezuela. En: Texto de las monografías presentadas en la Convención Nacional del Petróleo. Ofic. Técn. Hidrocarb., Min. Minas e Hidrocarb., Caracas (en castellano e inglés). Reimpreso, 1950 en: *Bol. Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról.*, 2: 182. Reimpreso, 1951 en: *Petrol. Interam.*, 9:(12): 26-29.(en castellano e inglés); 1953: en *Amer. Assoc. Petrol. Geol., Bull.*, 37(4): 774-775.

Ministerio de Minas e Hidrocarburos, 1956. Léxico Estratigráfico de Venezuela. *Bol. Geol. Pub. Esp.* N° 1. p. 728.

Payne, A. L., 1951. Cumarebo oil fields, Falcón, Venezuela, *Amer. Assoc. Petr. Geol. Bull.*, 35(8): 1850-1878.

Suter, H. N., 1937-a. Notas geológicas sobre la Formación Punta Gavilán de la región oriental del Estado Falcón. *Bol. Geol. y Min.*, Caracas, 1(2-4): 287-297.

Suter, H. N., 1937-b. Geologic notes on the "Punta Gavilán" Formation and on the eastern part of Falcón. *Bol. Geol. y Min.*, Caracas, 1(2-4): 269-279

Bibliografía de Léxicos Anteriores

Rutsch, R., 1934. Die Gastropoden aus dem Neogen der Punta Gavilán Schichten in nord-Venezuela. *Soc. Paleont. Suisse*, Mem. 54-55: 169.

Senn A., 1935. Die stratigraphische Verbreitung der Tertiären Orbitoiden, mit spezieller Berücksichtigung ihres Vorkommens in Nord- Venezuela und Nord- Marokko. *Eclog. Geol. Helv.*, 28(1): 51-113 y 369-373.

Stainforth, R. M., J. L. Lamb, H. Luterbacher, J. H. Beards y R. M. Jeffords, 1975. Cenozoic planktonic foraminiferal zonation and characteristics of index forms. *Univ. Kansas Paleont. Contrib.*, art. 62, 425 pp.

Vallenilla, L., P., 1961. Estratigrafía de las formaciones Caujarao, La Vela y Coro en sus localidades tipos, Estado Falcón. *Asoc. Venez. Geol. Min. y Petról.*, Bol. Inform., 4(12): 29-78.



**2a Edicion
LEV**



**1st Ed.
English**



**Comentarios
Recibidos**



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)