


**PRECAMBRICO**

Estado Bolívar

Referencia original: A. Espejo, 1974, p. 237.**Consideraciones históricas:** Espejo (1974) publicó este término para describir un plutón de granito, de forma elipsoidal intrusivo en las volcánicas de la Formación Yuruari de la región El Manteco - Gurí,

estado Bolívar.

Localidad tipo: El autor no seleccionó sección tipo. El plutón está ubicado en la hoja de Cartografía Nacional N° 7638, municipio autónomo Piar del estado Bolívar.**Descripción litológica:** Granito de grano medio, color gris azul y foliación incipiente o ausente. La textura es alotriomórfica granular con cristales en general menores de 0,5 mm. Los cristales anhedrales de cuarzo y feldespato presentan bordes aserrados y a veces desarrollan textura cataclástica. La foliación cuando está presente, está definida por la orientación de la mica en delgadas bandas discontinuas paralelas al alargamiento de los cristales félsicos. El análisis modal de la roca representa un granito biotítico, aunque los análisis químicos indican composición química de la granodiorita.**Ambiente tectónico y petrogénesis:** Según Espejo (1974), los caracteres mineralógicos y químicos de esta roca, las estructuras miarolíticas y sus relaciones estructurales y metamórficas con la roca caja indican que es un granito emplazado a poca profundidad en un ambiente cratónico relativamente frío y estable. Podrían representar intrusiones postectónicas relacionadas con diferenciación a profundidad, de una última removilización de las rocas del Escudo, que afectó principalmente la parte oriental de la Guayana Venezolana. Este evento anorogénico es designado por Espejo y Santamaría (1974) como Evento Plutónico El Manteco.**Contactos:** El Plutón es intrusivo en las metavolcánicas de la Formación de Yuruari, cuyo emplazamiento únicamente trunca el patrón estructural de la roca caja sin producir disturbio. Desarrolla angostas aureolas metamórficas en la roca caja, representada por la Formación Yuruari.**Extensión geográfica:** La unidad constituye un plutón que aflora en un área de forma elipsoidal de 35 Km².; está ubicada al este del río Caroní a unos 5 kilómetros al sureste de la isla Coroima.**Edad:** Precámbrico. Las edades determinadas por K/Ar., en rocas de la unidad, oscilan entre 1.500 y 1.570 m.a., (Espejo y Santamaría, 1974).**Importancia económica:** Posiblemente constituyan cierto alineamiento con zona de baja gravedad que sirvieran como vehículo para enriquecimiento en minerales básicos (Espejo, 1974) en la secuencia volcano-sedimentaria que intrusióna.

© M. E. M., 15 de Octubre de 1997

ReferenciasEspejo, A., 1974. Guía de la excursión N° 3, Upata-El Manteco. *IX Conf. Geol. Interguayanas*, Ciudad Guayana, estado Bolívar, p. 68-83.Espejo, A. y F. Santamaría, 1974. Significado de nuevas determinaciones de edades, potasio-argón en la Guayana venezolana, *IX Conf. Geol. Interguayanas*, Ciudad Guayana, estado Bolívar, p. 424-430.

Enviar Comentarios



**Comentarios
Recibidos**



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)