




CRETACICO (Maastrichtiense)

Estado Anzoátegui

Referencia original: H. H. Renz, 1962, Cuadro.

A base de faunas de foraminíferos bentónicos y planctónicos, Renz (1962) estableció una doble zonación en los sedimentos del Cretácico tardío y Terciario Temprano en la sección del río Querecual,

Anzoátegui nororiental. Subdividió los sedimentos cretácicos de la Formación Vidoño en dos zonas bentónicas, la superior de las cuales es la de *Guembelina plummerae*. Renz no describió sus zonas y subzonas bentónicas, pero en su cuadro faunal (Plate I) indicó la restricción a esta zona, en la sección tipo del río Querecual, de: *Guembelina plummerae*, *Boliviana incrassata*, *Bolivinoidea rhomboidea*, *Chrysalogonium cretaceum*, *Dentalina megapolitana*, *Guembelina plummerae*, *Marginulina jarvisi*, *Palmula jarvisi*, *Siphogenerinoides bramlettei*, *Vaginulina barcoensis*, *Valvulineria allomorphinoides*. *Guembelina plummerae* es una de las formas más abundantes en todo el intervalo que Renz subdividió en Subzonas de *Bolivinoidea rhomboidea*, inferior, y *Bolivia incrassata*, superior. En la sección del río Querecual esta zona corresponde a la parte media inferior de la Formación Vidoño y es de edad Maastrichtiense.

Referencias

Renz, H. H., 1962. Stratigraphy and paleontology of the type section of Santa Anita Group and overlying Merecure Group, río Querecual, State of Anzoátegui, northeastern Venezuela. *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petrol.*, Bol. Inform. 5(4): 89-108.

Enviar Comentarios



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)

Esta pagina ha sido visitada  veces