




**TERCIARIO (Oligoceno)**

Trinidad

**Referencia original:** H. M. Bolli, 1957-c, p. 100.

Brönnimann (1950) mencionó la presencia de numerosos ejemplares de *Globigerina apertura* y algunos de *Globigerina dissimilis* en una "asociación que sugiere Oligoceno basal", en la sección tipo de Cipero Coast, en Trinidad. Posteriormente, Suter (1951) introdujo una "Zona de *Globigerina apertura*" sin definirla. Kugler (1956), mencionó la "Zona de *Globigerina* aff. *apertura*". Bolli (1957-c) describió la especie titular con el nombre de *Globigerina ampliapertura* y definió la zona, basado principalmente en la extensión de esta especie a niveles superiores en la sección, por encima de las capas eocenas más antiguas en la secuencia zonal de Trinidad. Posteriormente, el mismo autor (1966) separó la parte inferior con el nombre de Zona de *Cassigerinella chipolensis/Hastigerina micra*.

En Venezuela la presencia de la Zona de *G. ampliapertura* en la Formación Los Jabillos y parte superior de la Formación Caratas ha sido mencionada por Lagaaij (1963) y Lamb (1964-b). Bermúdez (1962) enumeró la microfauna perfectamente conservada de esta zona en capas expuestas en Punta Tolete, cerca de Pedernales, las cuales sugirió incluir en el Grupo Merecure. Stainforth (1964-a) las consideró como pertenecientes a la Formación Carapita. Blow (1959) situó la parte basal de la Formación Guacharaca de Falcón en esta zona.

Por su posición concordante por encima de capas del Eoceno Tardío, la Zona de *Globigerina ampliapertura* corresponde en edad al Oligoceno Temprano.

Véase [\*\*GLOBIGERINA CIPEROENSIS, Zona de.\*\*](#)

### **Referencias**

- Bermúdez, P. J., 1962. Foraminíferos de lutitas de Punta Tolete, Territorio Federal Delta Amacuro, Venezuela. "Geos", Univ. Cent. de Venez., Caracas (8): 35-38. Reimpreso en: RIVERO, F. CH. de Bermúdez, P. J., (1963) Micropaleontología general, (Univ. Cent. Venez., Caracas, 808 p.), apéndice, p. 765-768. Resumen en: *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról.*, Bol. Inform., 7(9): 263.
- Brönnimann, P., 1950. Occurrence and ontogeny of *GLOBOGERINATELLA INSUETA* Cushman and Stainforth from the Oligocene of Trinidad, *B.W.I. Cush. Found. Foram. Res.*, Contrib., 1(3-4): 80-82.
- Blow, 1959. Age, correlation and biostratigraphy of the Upper Tocuyo (San Lorenzo) and Pozón formations, eastern Falcón, Venezuela. *Bull. Amer. Paleont.*, 39(178): 67-252.
- Bolli, H. M., 1957-c. Planktonic foraminifera from the Oligocene-Miocene Cipero and Lengua formations of Trinidad, *B.W.I. U.S. Nat. Mus.*, Bull., (215): 97-123.
- Kugler, H. G., 1956-a. Trinidad. En: Handbook of South America Geology, *Geol. Soc. Amer.*, Mem. 65, p. 351-365.
- Kugler, H. G., 1956-b. Trinidad. En: *Lexique Stratigraphique International*, Vol. V, Amer. Lat., fasc. 2b., Antilles, p. 39-116.
- Lagaaij, R., 1963. CUPULADRIA CANARIENSIS (Busk)-Potait of a Bryozoan. Paleontology, VI-1: 172-217. Resumen (1963): *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról.*, Bol. Inform., 6(5):151-152.
- Lamb, J. L., 1964-b. The geology and paleontology of the rio Aragua surface section, Serranía del Interior, State of Monagas, Venezuela. *Aoc. Venez. Geol., Min. y Petról.*, Bol. Inform., 7(4): 111-123.
- Stainforth, R. M., 1964-a. Origin of the name Peñas Blancas Formation. *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról.*, Bol. Inform., 7(9): 257-259.

Suter, H. H., 1951. The general and economic geology of Trinidad, *B.W.I. Col. Geol. Min. Res.* (London), H.M.S.O., 2(3): 177-217.

Enviar Comentarios



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)