




TERCIARIO (Eoceno Temprano)

Estado Anzoátegui

Referencia original: H. H. Renz, 1962, p. 101.

Esta zona, introducida por Renz (1962), equivale a la parte media de la Formación Caratas en la sección tipo del río Querecual. Contiene únicamente las especies *Globigerina linaperta* y *G. soldadoensis*, la segunda de las cuales indica una edad no menor que Eoceno Temprano. Corresponde a la parte superior de la Zona de *Globorotalia aragonensis* y a la Zona de *Globorotalia palmerae* de Bolli (1957-b, d).

Referencias

Bolli, H. M., 1957-b. The genera *Globigerina* and *Globorotalia* in the Paleocene-Lower Eocene Lizard Springs Formation of Trinidad, *B.W.I. U.S. Nat. Mus., Bull.*, (215): 61-81.

Bolli, H. M., 1957-d. Planktonic foraminifera from the Eocene Navet and San Bernardo formations of Trinidad, *B.W.I. U.S. Nat. Mus., Bull.*, (215): 155-172.

Renz, H. H., 1962. Stratigraphy and paleontology of the type section of Santa Anita Group and overlying Merecure Group, río Querecual, State of Anzoátegui, northeastern Venezuela. *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petrol., Bol. Inform.* 5(4): 89-108.

Enviar Comentarios



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)