




TERCIARIO (Mioceno Temprano)

Trinidad

Referencia original: J. A. Cushman y R. M. Stainforth, 1945, p. 4-6.

Esta zona fue introducida por Cushman y Stainforth (1945) con definición imprecisa, como división faunal de la Formación Cipero en Trinidad. Según Stainforth (1948), la zona ocupa el intervalo intermedio entre la extinción de *Globigerina ciperoensis* (*G. cf. "concinna"*) y la primera aparición de *Globorotalia fohsi*. Stainforth sugirió además una zona adicional en la parte inferior, a base de la presencia de *Catapsydrax* ("*Globigerina*") *dissimilis*, en ausencia tanto de *G. ciperoensis* como de *Globigerinatella insueta*, que fue establecida por Cushman y Renz (1947) mientras la monografía de Stainforth se hallaba aún en prensa. De esta manera, en su aceptación amplia se aceptó la ubicación de la Zona de *G. insueta* por encima de la Zona de *G. dissimilis* y por debajo de la Zona de *G. fohsi*.

Bolli (1957-c) refinó la zonación de la Formación Cipero; dividió la original Zona de *Globigerinatella insueta* en una zona superior, para la cual se mantuvo el mismo nombre y una inferior, que tomó el nombre de *Catapsydrax stainforthi*. Posteriormente, el mismo autor (1966) restringió aún más la Zona de *Globigerinatella insueta*, al separar la parte superior con el nombre de *Praeorbulina glomerosa*. Blow (1959) y Banner y Blow (1965) utilizaron una división comparable del período vital de *G. insueta*, pero aplicaron nombres zonales diferentes.

En Venezuela la presencia de la Zona de *G. insueta*, en sus sentidos tanto amplio como restringido, ha sido mencionada por Blow (1959) en la Formación San Lorenzo de Falcón, y por Lamb y De Sisto (1963), Lamb (1964) y Lamb y Sulek (1965) en la Formación Carapita de Monagas.

Referencias

Banner, F. T. y W. H. Blow, 1965. *Progress in the planktonic foraminiferal biostratigraphy of the Neogene*. Nature, 208(5016): 1164-1166.

Blow, 1959. Age, correlation and biostratigraphy of the Upper Tocuyo (San Lorenzo) and Pozón formations, eastern Falcón, Venezuela. *Bull. Amer. Paleont.*, 39(178): 67-252.

Bolli, H. M., 1957-c. Planktonic foraminifera from the Oligocene-Miocene Cipero and Lengua formations of Trinidad, *B.W.I. U.S. Nat. Mus.*, Bull., (215): 97-123.

Bolli, H. M., 1966. Zonation of Cretaceous to Pliocene marine sediments based on planktonic foraminifera. *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról.*, Bol. Inform., 9(1): 3-32.

Cushman, J. A. y H. H. Renz, 1947. The foraminiferal fauna of the Oligocene Ste. Croix Formation of Trinidad, *B.W.I. Cushman Lab. Foram. Res.*, Sp. Publ. 22, 46 pp.

Cushman, J. A. y R. M. Stainforth, 1945. The foraminiferal fauna of the Cipero Marl Formation of Trinidad, *B.W.I. Cushman Lab. Foram. Res.*, Sp. Publ. 14, p. 3-75.

Lamb, J. L., 1964-a. The stratigraphic occurrences and relationships of some Mid-Tertiary *Uvigerinas* and *Siphoguerinas*. *Micropaleontology*, 10(4): 457-576. Resumen (1964) en: *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról.*, Bol. Inform., 7(12): 379.

Lamb, J. L., 1964-b. The geology and paleontology of the rio Aragua surface section, Serranía del Interior, State of Monagas, Venezuela. *Aoc. Venez. Geol., Min. y Petról.*, Bol. Inform., 7(4): 111-123.

Lamb, J. L. y J. De Sisto, 1963. the Morichito Formation of northern Monagas. *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról.*, Bol. Inform., 6(9): 269-276.

Lamb, J. L. y J. A. Sulek, 1965-a. Miocene turbidities in the Carapita formation of eastern Venezuela. *Asoc. Venez. Geol., Mín. y Petról., Bol. Inform.*, 8(3): 82.

Stainforth, R. M., 1948-a. Description correlation and paleoecology of Tertiary Cipero Marl Formation, Trinidad, *B.W.I. Amer. Assoc. Petrol. Geol., Bull.*, 32(7): 1292-1330.

Stainforth, R. M., 1948-b. Applied micropaleontology in coastal Ecuador. *Jour. Paleont.*, 22(2): 113-151.

Enviar Comentarios



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)