




TERCIARIO (Eoceno Temprano)

Trinidad

Referencia original: H. M. Bolli, 1957-b, p. 100.

Bolli (1957-b) estableció esta zona en la Formación Lizard Springs de Trinidad, del Paleoceno-Eoceno Temprano. En la sección tipo de la Formación Vidoño en el río Querecual, Renz (1962) consideró a su

Zona de *Globorotalia velascoensis* como incluyente de la zona del mismo nombre establecida por Bolli en Trinidad, y la dividió en tres subzonas, de las cuales la de *G. pusilla pusilla* es la intermedia, sólo parcialmente equivalente a la zona del mismo nombre en Trinidad.

Véase [**GLOBOROTALIA VELASCOENSIS, Zona de.**](#)

Referencias

Bolli, H. M., 1957-b. The genera *Globigerina* and *Globorotalia* in the Paleocene-Lower Eocene Lizard Springs Formation of Trinidad, *B.W.I. U.S. Nat. Mus., Bull.*, (215): 61-81.

Renz, H. H., 1962. Stratigraphy and paleontology of the type section of Santa Anita Group and overlying Merecure Group, río Querecual, State of Anzoátegui, northeastern Venezuela. *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petrol.*, Bol. Inform. 5(4): 89-108.

Enviar Comentarios



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)