




**CUATERNARIO** (Pleistoceno-Reciente)

Distrito Federal

**Referencia original:** H. M. Bolli, 1966, p. 25.

Bolli y Bermúdez (1965) habían establecido la Zona de *Globorotalia truncatulinoides*/*Globorotalia inflata*, con sección tipo en la parte inferior de la Formación Playa Grande del Grupo Cabo Blanco, en el

Distrito Federal. Posteriormente, Bolli (1966) abrevió su nombre a Zona de *Globorotalia truncatulinoides*. La unidad suprayace a la Zona de *Globoquadrina altispira altispira*/*Globorotalia tuncatulinoides*, no reconocida en Venezuela, que parece corresponder al hiato entre las formaciones Cubagua y Cumaná. La separación de estas zonas se coloca al nivel de extinción de *G. a. altispira*.

Bolli y Bermúdez (1965) y Bolli (1966) indicaron una edad Plioceno hasta Reciente. No obstante, los estudios más recientes (Cati *et al.*, 1968) ubican la zona infrayacente en el nivel superior extremo del Plioceno, lo cual implicaría que la Zona de *Globorotalia truncatulinoides* corresponde al intervalo Pleistoceno Reciente.

### **Referencias**

Bolli, H. M., 1966. Zonation of Cretaceous to Pliocene marine sediments based on planktonic foraminifera. *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról.*, Bol. Inform., 9(1): 3-32.

Bolli, H. M. y P. J. Bermúdez, 1965. Zonation based on planktonic foraminifera of Middle Miocene to Pliocene warm-water sediments. *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról.*, Bol. Inform., 8(5): 121-149.

Cati, F.; M. L. Colalongo; U. Crescenti; S. D'Onofrio; U. Follador; C. Pirini Raddrizzani; A. Pomesano Cherchi; G. Salvarorini; S. Sartorini; I. Premoli Silva; C. F. Wezel; V. Bertolino; G. Bizon; H. M. Bolli; A. M. Borsetti Cati; L. Dondi; H. Feinberg; D. G. Jenkins; E. Perconing, M. Sampo y R. Sprovieri, 1968. Biostratigrafía del Neogeno mediterraneo basata sui foraminiferi planctonici. *Soc. Geol. Ital.*, Boll., 87, 491-503.

Enviar Comentarios



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)