

***GLOBOTRUNCANA APPENNINICA*, Zona de**

CRETACICO (Cenomaniense)

Estado Anzoátegui

Referencia original: E. Rod y W. Maync, 1954, p. 277.

Esta zona fue establecida por Maync (en: Rod y Maync, 1954) como la más joven de sus cuatro "faunizonas" en la sección cretácica de la Serranía del Interior de Venezuela nororiental. La unidad se caracteriza por la presencia de *Globotruncana (Rotalipora) appenninica*, especie índice del Cenomaniense, y se restringe a la "Formación Boquerón", de Rod y Maync, incluida por otros autores en la parte superior de la Formación Chimana.

Referencias

Rod, E. y W. Maync, 1954. Revisión of Lower Cretaceous stratigraphy of Venezuela. *Amer. Assoc. Petrol. Geol., Bull.*, 38(2): 193-283.

Bibliografía de Léxicos Anteriores

Hedberg, H. D., 1950-a. Geology of the eastern Venezuela basin (Anzoátegui-Monagas-Sucre- eastern Guárico portion). *Geol. Soc. Amer., Bull.*, 61(11): 1173-1216.

Hedberg, H. D. y A. Pyre, 1944. stratigraphy of northeastern Anzoátegui, Venezuela. *Amer. Assoc. Petrol. Geol., Bull.*, 20(1): 1-28.

Enviar Comentarios

	
1st Ed. English	Comentarios Recibidos



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)

Esta pagina ha sido visitada  veces