




CRETACICO (Maastrichtiense)

Estado Anzoátegui

Referencia original: H. H. Renz, 1962, p. 99.

A base de foraminíferos, Renz (1962) estableció una doble zonación (bentónica y planctónica) en sedimentos del Cretácico Tardío y Terciario Temprano en la sección del río Querecual, Anzoátegui nororiental. La zona planctónica más joven del Cretácico es la de *Globotruncana contusa*, con una rica fauna de foraminíferos planctónicos, entre los cuales las especies *Abathomphalus intermedia*, *Globotruncana contusa* y *Globotruncana rosetta* se restringen a la zona.

En la sección del río Querecual la zona de *Globotruncana contusa* corresponde a la parte media-inferior de la Formación Vidoño y es de edad Maastrichtiense. Renz mencionó su probable correlación con la Zona de *Abathomphalus mayaroensis* de Bolli (1957-a), también del Maastrichtiense Tardío en Trinidad.

Referencias

Bolli, H. M., 1957-a. The genera *PRAEGLOBOTRUNCANA*, *ROTALIPORA*, *GLOBOTRUNCANA* and *ABATHOMPHALUS* in the Upper Cretaceous of Trinidad, *B.W.I. U.S. Nat. Mus., Bull.*, (215): 51-60.

Renz, H. H., 1962. Stratigraphy and paleontology of the type section of Santa Anita Group and overlying Merecure Group, río Querecual, State of Anzoátegui, northeastern Venezuela. *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petrol., Bol. Inform.* 5(4): 89-108.

Enviar Comentarios



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)