


**PALEOGENO (Oligoceno)**

Estado Falcón

Referencia original: H. H. Suter, 1947, p. 2195-96.

Consideraciones históricas: La referencia original se debe a Suter (1947), quien menciona brevemente una unidad con ese nombre en el subsuelo del campo Mene de Acosta, discordantemente por encima de las Lutitas de Cerro Misión y concordantemente por debajo de las Arenas de El Salto.

Renz (1948) menciona que la Formación Guacharaca aflora parcialmente en el flanco sur del alto estructural del mismo nombre. Renz (LEV I, 1956) menciona lentes de caliza con orbitoides "del tipo de cerro Campana" en la parte inferior de la formación, en el alto de Guacharaca. Blow (1959) le asigna una edad oligocena, que en el tope llega a la parte inicial del Mioceno. Wheeler (1960) menciona una subdivisión en tres miembros, efectuada por la North Venezuelan Petroleum en el flanco norte del alto de Guacharaca: el miembro inferior, de intercalaciones de lutitas con areniscas, denominado La Danta, corresponde en nombre a las Arenas de Guayaval-La Danta de Suter (1947), pero en posición estratigráfica muy distinta, por lo cual debe considerarse un término inválido; el miembro intermedio, margas de Tucurere; el miembro superior, arcillas de Cotiza, con algunas delgadas intercalaciones de areniscas y limolitas. Al sur de la estructura de Guacharaca, la North Venezuelan Petroleum reconoce solamente La Danta y el autor discute ampliamente este hecho, sin llegar a ninguna conclusión. Wheeler (1963) no hace mención a los tres miembros y asoma el estado de confusión existente acerca de la definición y alcances de la Formación Guacharaca, pese a lo cual el LEV II (1970) incluye los miembros anteriores como válidos. Wheeler (1963) sugiere que el contacto entre las formaciones Cerro Misión y Guacharaca se coloque por encima de las calizas orbitoidales y discute el problema del contacto superior de la formación con el Miembro El Salto de la Formación San Lorenzo, llegando a la conclusión de que este es probablemente discordante. Díaz de Gamero (1985b) excluye las calizas con orbitoides de la formación y propone incluir la Formación Guacharaca dentro del Grupo Agua Salada, ya que es litológicamente muy similar y, así definido, el grupo constituye un solo ciclo sedimentario entre dos discordancias. Del Olio, *et al.* (1994) incluyen información sobre la geoquímica orgánica de las rocas de esta formación.

Localidad tipo: En el flanco sur del alto estructural de Guacharaca, unos 10 km al norte-noroeste de la estación trigonométrica de Pozón, distrito Acosta, estado Falcón (Renz, 1948). Hoja de Cartografía Nacional N° 6449, a escala 1:100.000.

Descripción litológica: En la descripción original de Suter (1947), este autor menciona que la unidad contiene areniscas glauconíticas en su parte superior, dispuestas en capas delgadas (1,5 a 6,5 m), que denomina Arenas de Guayaval-La Danta. En el subsuelo de Mene de Acosta, la formación consiste de una secuencia de lutitas calcáreas y no calcáreas y lutitas limolíticas, con capas ocasionales de arenisca en su parte superior (Renz, 1948). Wheeler (1960) menciona que, al norte del alto de Guacharaca la formación consiste, de base a tope, de lutitas y arcillas con frecuentes interestratificaciones de capas delgadas de arenisca de grano fino (Miembro La Danta), seguidas de margas (Miembro Tucurere) y arcillas (Miembro Cotiza). Al sur de la estructura, se reconoce solamente la unidad inferior, La Danta. En la parte norte de la subcuenca de Agua Salada, Díaz de Gamero (1985b) no puede discriminar, en base a criterios litológicos, la Formación Guacharaca en ausencia del Miembro El Salto de la Formación San Lorenzo, por ser enteramente lutítica, con un intervalo intermedio de lutitas calcáreas que seguramente corresponde al Miembro Tucurere de Wheeler (1960).

Espesor: 235 a 250 m en el subsuelo de Mene de Acosta (Renz, 1948); 1.200 m al sur de Mirimire y 250 m en el flanco sur del alto de Guacharaca (Wheeler, 1960).

Extensión geográfica: En Falcón oriental, en el alto de Guacharaca, campo de Mene de Acosta y alrededores, aunque Wheeler (1960) la menciona al sur de Mirimire.

Contactos: Las relaciones estratigráficas según Renz (1948) son de concordancia, tanto en su base como en su tope. De acuerdo a Wheeler (1960, 1963), el contacto inferior es de discordancia con la Formación Cerro Misión, del Eoceno, aunque esta relación no es evidente en campo.

Wheeler (1960,1963) presenta dos modelos estratigráficos para el contacto superior, uno con contacto concordante y otro discordante, concluyendo que el problema necesita más estudio.

Fósiles: Renz (1948) no estudia la microfauna de las partes inferior y media de la Formación Guacharaca. Los 81 m superiores están incluidos en su Zona de "*Uvigerinella*" *sparsicostata*, que continúa hacia arriba hasta el Miembro El Salto y parte del Miembro Menecito de la Formación San Lorenzo. El autor no separa la microfauna correspondiente a la formación, dentro de la mencionada zona. Blow (1959) estudia los foraminíferos planctónicos de la parte superior, a fin de establecer la edad del contacto con la Formación San Lorenzo, suprayacente.

Edad: Blow (1959) considera la Formación Guacharaca como oligocena, llegando hasta el inicio del Mioceno, Zona de *Globorotalia kugleri*, en base a foraminíferos planctónicos. Wheeler (1963) la considera enteramente oligocena.

Correlación: Wheeler (1960) correlaciona la Formación Guacharaca con las formaciones El Paraíso y Pecaya de Falcón central, en lo que coincide Díaz de Gamero (1985b); se correlaciona asimismo con las Formación Churuguara del borde sur de la cuenca.

Paleoambientes: Marino relativamente profundo. No existe ninguna publicación que documente este aspecto.

Geoquímica: Del Olla, *et al.* (1994) mencionan que los bitúmenes de la Formación Guacharaca se correlacionan con menes del área de Pozón utilizando marcadores biológicos. Los mismos autores encuentran que los menes ubicados en la subcuenca de Agua Salada presentan una distribución de marcadores biológicos similar a la de crudos y menes de Falcón occidental, a pesar de la enorme diferencia en los ambientes deposicionales entre ambas áreas. Así, los análisis de CG y CG-EM indican que los crudos y menes en la cuenca, al igual que los bitúmenes del Grupo Agua Salada, fueron originados de materia orgánica derivada de una mezcla de material marino y terrestre sedimentada en un ambiente transicional con influencia de desarrollos deltaicos.

Véanse [AGUA SALADA, Grupo](#); [AGUA SALADA, Formación](#); [COTIZA, Miembro](#); [TUCURERE, Miembro](#); [LA DANTA, Miembro](#).

© **M. L. Díaz de Gamero, 1997**

(Actualizado por: María Lourdes Díaz de Gamero, agosto 1997)

Referencias

- Blow, W. H., 1959. Age correlation and biostratigraphy of the Upper Tocuyo (San Lorenzo) and Pozón formations, eastern Falcón, Venezuela, *Bull. Amer. Paleont.*, 39(178): 67-252.
- Del Olla, D., M. Escandón y F. Galarraga, 1994. Origen del petróleo en la cuenca de Falcón (Resumen), *V Simposio Bolivariano de Exploración Petrolera en las Cuencas Subandinas*, Mem.: 408-410.
- Díaz de Gamero, M. L., 1985-b. Estratigrafía de Falcón nororiental, *VI Congr. Geol. Venez.* Mem., 1: 454-502.
- Ministerio de Minas e Hidrocarburos, 1956. Léxico Estratigráfico de Venezuela, *Bol. Geol. Pub. Esp.*, 1, 728 p.
- Ministerio de Minas e Hidrocarburos, 1970. Léxico Estratigráfico de Venezuela, *Bol. Geol. Pub. Esp.*, 4, 756 p.
- Renz, H. H., 1948. Stratigraphy and fauna of the Agua Salada group, State of Falcón, Venezuela, *Geol. Soc. Am.*, Men. 32, 219 p.
- Suter, H. H., 1947. El Mene de Acosta field, Falcón, Venezuela, *Am. Assoc. Petrol. Geol., Bull.*, 31(12): 2193-2206.
- Wheeler, C. B., 1960. Estratigrafía del Oligoceno y Mioceno Inferior de Falcón Occidental y Nororiental *III Cong. Geol. Venez.*, Tomo I, Bol. Geol. Public. Espec. (3): 407-465.
- Wheeler, C. B., 1963. Oligocene and Lower Miocene stratigraphy of western and northeastern Falcón Basin, Venezuela. *Amer. Assoc. Petrol. Geol. Bull.*, 47(1): 35-68. Resumen (1963) en: *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petrol.*, Bol. Inform., 6(5): 154.

Bibliografía de Léxicos Anteriores

Liddle, R. A., 1946. *The geology of Venezuela and Trinidad*. 2nd. ed., Paleont. Res. Inst., Ithaca, New York, 890 p.

Senn, A., 1935. Die stratigraphische Verbreitung der Tertiären Orbitoiden, mit spezieller Berücksichtigung ihres Vorkommens in Nord-Venezuela und Nord-Marokko, *Eclog. Geol. Helv.*, 28(1): 51-113, 369-373.

Senn, A., 1940. Paleogene of Barbados and its bearing on history and structure of Antillean-Caribbean region, *Am. Assoc. Petrol. Geol., Bull.*, 24(9): 8-1610.

Wiedenmayer, C., 1924. Zur Geologie von Ostfalcon (Nordwest-Venezuela), *Eclog. Geol. Helv.*, 18(4): 508-512.

Enviar Comentarios

		
2a Edicion LEV	1st Ed. English	Comentarios Recibidos



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)