

PRECAMBRICO

Estado Bolívar

Referencia original: J. H. Ríos, 1969, p. 1769.

Consideraciones históricas: Ríos (1969) propone este nombre para designar a un conjunto de rocas de composición granítica, con textura gneisica que afloran extensamente al oeste del río Cuchivero, en la parte noroccidental del estado Bolívar y lo incluye dentro de la Asociación Ignea Cuchivero. McCandless (1965) menciona en esa misma área la existencia de pórfidos graníticos gneisicos, los cuales parecen corresponder a la unidad propuesta.

Localidad tipo: Ríos (*op. cit.*) menciona que el granito aflora extensamente en cerros, ríos y quebradas al oeste del río Cuchivero. Mendoza (1972) recomienda establecer como localidad tipo la parte superior de la quebrada La Magdalena, tributaria del río Guaniamito.

Descripción litológica: La unidad está constituida por rocas de composición granítica, ricas en félsicos en gran parte con textura gneisica, de grano medio a grueso, holocristalinas, porfídicas, que hacia las zonas de contacto con las rocas volcánicas muestran indicios de metamatismo y de deformación mecánica. Hacia las zonas centrales de los afloramientos disminuye el caracter gneísico. La roca está constituida por cuarzo (10-30%), feldespato (25-65%), biotita (1-8%) y menores cantidades de muscovita, sericita. Como accesorios comunes se encuentran esfena, epidoto, hornablenda, titanita, zircón y magnetita. Se diferencia este granito del de Santa Rosalía 1) por el desarrollo de gneisoidad y 2) por su composición; el de Santa Rosalía es más rico en cuarzo y más pobre en feldespato potásico.

Extensión geográfica: Aflora extensamente al oeste del río Cuchivero en los cerros de El Tigre, Cacarrañao, Las Vainillas, El Chingo y en el río Guaniamo y Quebrada La Magdalena.

Contactos: Intrusivo con las volcánicas de la Formación Caicara, se observan zonas de Cizallamiento y con marcado desarrollo de gneisoidad en el granito. Con el granito de Santa Rosalía no se observó el contacto.

Edad: Hurley *et al.* (1968) determinaron una edad absoluta por Rb/Sr roca total, de $1690 \pm ?$ m.a. Olmeta (1968) obtuvo, por K-Ar en roca total, 1700 ± 80 m.a. Estas determinaciones colocan su emplazamiento dentro del Evento Transamazónico.

Correlación: De acuerdo a determinaciones de edad y a las características litológicas, puede ser correlacionable con el Granito de San Pedro del Grupo Cuchivero o Supergrupo Cedeño, y en la Provincia de Pastora con la granodionita de San Pedro de Las Bocas, con el gneis de Pueblito y con la cuarzodiorita de Santa Justa. En el Estado Amazonas con el gneis de Macabana y con el Gneis o Migmatitas de Miniera (Barrios, 1985).

© J. H. Rios, 1997

Referencias

Barrios, F., 1985. Geología de la subregión Atabapo Guarinuma. Territorio Federal Amazonas. *Simp. Amazónico, 1*. Puerto Ayacucho, T. F. Amazonas. p. 9-21.

McCandless, G. L., 1965. Reconocimiento geológico de la región noroccidental del Estado Bolívar. *Bol. Geol.*, Caracas, 7(13): 19-28.

Hurley, P. M.; J. Kalliokosky; H. N. Fairbairn y W. H. Pinson Jr., 1968. An age of 3000 (+) m.y. for the Imataca Series, Venezuela. En: Variations in isotopic abundances of strontium, calcium and argon and related topics. *M.I.T. Dept. Geol. Geophys.* 16 th.ann. Rept. 1381-16. p. 67-69.

Mendoza, V., 1972. Geología del área del río Suapure, parte noroccidental del Escudo de Guayana, Estado Bolívar, Venezuela. *IX Cong. Geol. Inter-Guayanas*, p. 306-338.

Olmata, M. A., 1968. Determinación de edades radiométricas de rocas de Venezuela. *Bol. Geol. Caracas* 10(19): 340-344.

Ríos, J. H., 1969. Geología de la región de Caicara, Estado Bolívar, *IV Cong. Geol. Venez.*, Caracas, MEM., III: 1759-1782.

Enviar Comentarios



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)