




CRETACICO TEMPRANO

Estado Sucre

Referencia original: C. González de Juana, H. G. Muñoz y M. Vignali, 1965, p. 63.

Este nombre fue introducido por González de Juana *et al.* (1965) para designar el miembro inferior de la Formación Cariaquito, con localidad tipo en la quebrada Guatay cerca de Macuro, península de Paria, Estado Sucre. La unidad aflora en una faja angosta a lo largo de la parte sur de Paria oriental y desaparece al oeste de Güiria. Consiste de cuarcitas delgadas esquistosas, intercaladas con esquistos cuarzo-micáceos replegados de colores claros, que al meteorizar toman tintes marrones y rojizos característicos. Su espesor en la sección tipo es de 470 metros, y disminuye hacia el oeste. El miembro es concordante por encima de la Formación Macuro y por debajo del Miembro Patao de la Formación Cariaquito, relaciones estratigráficas que determinan su edad Cretáceo Inferior. Se considera como equivalente probable de parte de la Formación Grande Rivière de Trinidad.

Véase [CARIAQUITO, Formación](#).

Referencias

González de Juana, C., H. G. Muñoz y M. Vignali, 1965. Reconocimiento geológico de la parte oriental de Paria. *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról.*, Bol. Inform., 8(9): 255-279.



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)

Esta pagina ha sido visitada  veces