




CRETACICO (Albiense Temprano(?)-Medio)

Estado Monagas

Referencia original: E. Rod y W. Maync, 1954, p. 277.

La Zona de *Haplostiche*, con *Haplostiche texana*, fue establecida por Maync (en Rod y Maync, 1954) en la Serranía del Interior de Venezuela nororiental. Según el autor, esta zona se restringe a la parte inferior de la Formación Chimana, que atribuyó al Albiense Temprano (?) y Medio.

Además del género titular, Maync enumeró los siguientes foraminíferos restringidos a la parte inferior de la Formación Chimana: *Lituola subgoolandensis*, *Lituola* sp., *L. aff. L. camerata* y *Triplasia acutocarinata*, y señaló que la forma típica de *Haplostiche texana* se reconoce también en la Formación Lisure de la Sierra de Perijá.

Referencias

Rod, E. y W. Maync, 1954. Revisión of Lower Cretaceous stratigraphy of Venezuela. *Amer. Assoc. Petrol. Geol.*, Bull., 38(2): 193-283.

Bibliografía de Léxicos Anteriores

Garner, A. H., 1926. Suggested nomenclature and correlation of the geological formations in Venezuela, *Am. Inst. Min. Metall. Eng.*, Tr., p. 677-684.

Hedberg, H. D., 1950-a. Geology of the eastern Venezuela basin (Anzoátegui-Monagas-Sucre- eastern Guárico portion). *Geol. Soc. Amer.*, Bull., 61(11): 1173-1216.

Hedberg, H. D. y A. Pyre, 1944. stratigraphy of northeastern Anzoátegui, Venezuela. *Amer. Assoc. Petrol. Geol.*, Bull., 20(1): 1-28.

Liddle, R A., 1928. *The geology of Venezuela and Trinidad*, J. P. MacGowan, Fort Worth, Texas, 662 p.

Wells, J. W., 1944. Cretaceous, Tertiary, and recent corals, a sponge and an Algae from Venezuela, *Jour. Paleont.* 18(5): 429-447.

Enviar Comentarios



1st Ed. English



Comentarios Recibidos



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)