




CUATERNARIO (Pleistoceno)

Estado Sucre

Referencia original: O. Macsotay y L. F. Caraballo, 1976, p. 25-26.

Consideraciones históricas: Macsotay y Caraballo (1976), separan las calizas coquinoideas "formadas por un solo género de bivalvos" de Balda (1960), junto con los horizontes calcáreos-conglomeráticos superiores de la Formación Chiguana, con el nombre de Miembro Las Varas. El nombre procede del cerro Las Varas, la colina de mayor elevación a lo largo de la carretera Campona-Chiguana, que constituye la sección tipo de la Formación Chiguana. El miembro se halla restringido a la misma área de la formación.

Véase [CHIGUANA, Formación](#).

© *O. Macsotay, 1997*

Referencias

Balda, F. A., 1960. Estructura geológica de Chiguana, Península de Araya, Estado Sucre. *III Cong. Geol. Venez.*, Caracas, 1959, Mem., 2: 928-934.

Macsotay, O. y L. F. Caraballo, 1976. *Geología y estratigrafía Cenozoica de la parte oriental del Golfo de Cariaco*, Estado Sucre, Venezuela. *Geology and Cenozoic biostratigraphy of the eastern part of the Gulf of Cariaco*, Sucre, Venezuela, Universidad de Oriente, Instituto Oceanográfico, Cumaná, Venezuela; Boletín del Instituto Oceanográfico de la Universidad de Oriente, Venezuela, Journal Article, 15(1): 25-26.

Enviar Comentarios



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)