

TERCIARIO (Eoceno Medio)

Estado Barinas

Referencia original: S. Osuna, O. Macsotay y R. Arnstein, 1995, p. 83.

Consideraciones históricas: Osuna, *et al.* (1995) fueron los primeros en proponer por publicación la división de la Formación Pagüey en tres miembros que, en orden ascendente, son los "miembros" Arandia, La California e Higüerones. Los nombres fueron propuestos originalmente por Aguasuelos (1990, p. 198) y discutidos luego por Osuna (1994) en informes inéditos. Las dificultades en diferenciar los cambios sutiles de sus litologías, definir lateral y verticalmente sus contactos transicionales, y trazar las unidades regionalmente hacen dudoso su utilidad como nombres estratigráficos formales. Se aplican estos nombres informales principalmente en el área de afloramiento entre los ríos Santo Domingo y Calderas, y hasta el río Tucupido.

El miembro La California tiene su sección tipo desde el tope del cerro La California hasta la Falla Canaguá en el flanco sur del cerro Azul (Aguasuelos, 1990). Según Osuna *et al.* (1995), es una secuencia de engrosamiento compuesta de ciclos hectométricos de lutitas, limolitas y areniscas; las areniscas subgrauváquicas, de grano fino a grueso alcanzan espesores de 14 m en los 200 m superiores. Osuna *et al.* reportan un espesor de unos 1200 m en la sección tipo, 1130 m cerca del pozo Uzcátegui-2 y 1980 m en el área Barinitas-Altamira. Las capas arenosas forman filas y cuevas de buzamiento, por su relativa dureza y resistencia a la erosión. Contienen macrofósiles y abundantes icnofósiles que sugieren un ambiente sedimentario que varía progresivamente hacia arriba desde talud a nerítico (Osuna, 1994) Su espesor es de unos 1000 m y su edad es Eoceno Medio. Monroy y Di Gianni (en Osuna *op.cit.*, p. 34) identificaron la siguiente flora en muestras de las quebradas Bellaca y Arandia, indicativas del Eoceno Medio. Palinomorfos: *Janmulleripollis pentaradiatus*, *Echitriporites trianguliformis "A"*, *Bombacacidites foveoreuculatus*. Nannoplancton: *Dicoaster saipaniensis*, *Chiasmolithus solitus*, *Reticulofenestra umbilica* y *Helicosphaera dineseni*. De acuerdo a las asociaciones de microfósiles descritas, la edad del Miembro La California es Eoceno Medio, Zona 23 de Muller *et al.*, (1985) y Zona NP-16 de Martini (1971). Ambiente de plataforma externa a talud ha sido interpretado para el miembro La California en base a la presencia de *Textularia* sp., *Nummulites* sp., *Globobulimina* sp., *Hanzawaia concentrica* y *Cyclammina* sp. Aguasuelos, en Osuna *et al.* (1995, p. 84) mencionan los icnofósiles *Thalassinoides*, *Ophiomorpha*, *Macanopsis*, *Teichichnus* que corresponden a conjuntos de plataforma externa.

Véase [PAGÜEY, Formación](#).

© **G. D. Kiser, 1997**

Referencias

Aguasuelos Ingenieria, S. C., 1990 Modernización de datos geológicos en el frente de montaña. Vol. III, Estratigrafía/Sedimentología. Corpoven S.A. *Informe Inédito*, 517 p.

Martini, E., 1971. Standard Tertiary and Quaternary calcareous nannoplankton zonation. In A. Farinacci ed. *Proceedings II Planktonic Conference*, Roma, 1970, 2, 739-85.

Müller, J., E. Di Giacomo y A. W. van Erve, 1985. A palynological zonation for the Cretaceous, Tertiary and Quaternary of northern South America. VI Congreso Geológico Venezolano, Memoria Tomo II, 1041-1079.

Osuna, S., 1994. Geología de superficie del frente de montañas de Barinas. *Informe inédito Corpoven, S. A.*, 86 p.

Osuna, S., O. Macsotay y R. Arnstein, 1995. Sedimentación de antefosa Eoceno medio-superior en Barinas, Venezuela. *Boletín de Geología*, Publicación Especial 11.

Enviar Comentarios



**Comentarios
Recibidos**



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)