




CRETACICO TARDIO

Estado Lara

Referencia original: E. Von der Osten y D. Zozaya, 1957, p. 15.

Von der Osten y Zozaya (1957) introdujeron este término para designar el último miembro, en orden estratigráfico ascendente, de los siete que constituyen su Formación Cazadero. La unidad tiene 100 metros de espesor y se compone de fanitas bien estratificadas de colores amarillo, crema, naranja y blanco, que meteorizan en blanco cremoso y se parten formando abundantes lajitas. Según Rod (1959) la unidad es parte de la repetición por sobrecorrimiento del Miembro Cimarrona, teoría posteriormente negada por Von der Osten (1967).

El término Cazadero ha sido sustituido posteriormente por el de Formación Barquisimeto, pero sus miembros retienen su validez local.

Véase [BARQUISIMETO, Formación](#).

Referencias

Rod, E., 1959-a. West and of Serranía del Interior, eastern Venezuela. *Amer. Assoc. Petrol. Geol., Bull.*, 43(4): 772-789.

Rod, E., 1959-b. Formación Capacho en Trujillo septentrional y en Lara suroriental. *Bol. Geol.*, Caracas, 5(10): 49-66.

Von der Osten, E. y D. Zozaya, 1957. Geología de la parte suroeste del Estado Lara región de Quibor (Carta 2.308). *Bol. Geol.*, Caracas, 4(9): 3-52.

Von der Osten, E., 1967. Lower Cretaceous Barranquín Formation of northeastern Venezuela. *Amer. Assoc. Petrol. Geol., Bull.*, 41(4): 679-708.

Enviar Comentarios



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)