




TERCIARIO (Mioceno Tardío)

Estado Falcón

Esta es una de las zonas establecidas por Renz (1948) en su estudio bioestratigráfico del Grupo Agua Salada. Suprayace a la Zona de *Valvulineria berricki* e infrayace a la de *Robulus senni*, corresponde a parte del Miembro Husito de la Formación Pozón. Petzall (1959) la reconoció en la región de La Vela, en un intervalo que abarca la base de la Formación Caujarao y parte superior de la Formación Socorro. Blow (1959) estudió los foraminíferos planctónicos y correlacionó la zona de Renz con su Subzona de *Globorotalia mayeri*/*Globigerina nepenthes* y Zona de *Globorotalia m. menardii*/*Globigerina nepenthes*. De acuerdo con las determinaciones más recientes (Cati *et al.*, 1968) estas zonas corresponden al Mioceno Tardío.

Referencias

Blow, W. H., 1959. Age, correlation and biostratigraphy of the Upper Tocuyo (San Lorenzo) and Pozón formations, eastern Falcón, Venezuela. *Bull. Amer. Paleont.*, 39(178): 67-252.

Cati, F.; M. L. Colalongo; U. Crescenti; S. D'Onofrio; U. Follador; C. Pirini Raddrizzani; A. Pomesano Cherchi; G. Salvarorini; S. Sartorini; I. Premoli Silva; C. F. Wezel; V. Bertolino; G. Bizon; H. M. Bolli; A. M. Borsetti Cati; L. Dondi; H. Feinberg; D. G. Jenkins; E. Perconing, M. Sampo y R. Sprovieri, 1968. Biostratigrafía del Neogeno mediterraneo basata sui foraminiferi planctonici. *Soc. Geol. Ital.*, Boll., 87, 491-503.

Petzall, C. K. de, 1959. Estudio de una sección de la Formación Caujarao en el anticlinal de La Vela, Estado Falcón. *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról.*, Bol. Inform., 2(10): 269-320.

Renz, H. H., 1948. Startigraphy and fauna of the Agua Salada Group, State of Falcón, Venezuela. *Geol. Soc. Amer.*, Mem. 32, p. 219.

Enviar Comentarios

1st Ed. English	Comentarios Recibidos



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)