

PRECAMBRICO

Estado Amazonas

Referencia original: Mendoza, V.; L. Moreno; F. Barrios; D. Rivas; J. Martínez; P. Lira; G. Sardi y S. Ghosh, 1977, p. 373.

Consideraciones históricas: Mendoza *et al.* (1977) se refieren con este nombre, informalmente, a un conjunto de rocas graníticas que afloran en los ríos Marieta y Guapuchi, estado Amazonas. Posteriormente, Rivas (1985) lo describe en los ríos Orinoco, Ventuani, Guapuchi y Caño Cucurital en la región centro-occidental del estado Amazonas.

Localidad tipo: Se mencionan afloramientos de este granito en el río Marieta (raudal de la Travesía), estado Amazonas (Hoja ????, esc. ???, Cartografía Nacional).

Descripción litológica: La unidad consiste en rocas graníticas semi-masivas, debidamente tectonizadas y recrystalizadas, que muestran texturas porfídicas pseudorapakivi. Petrográficamente la roca presenta cuarzo en cristales enhedrales, en crecimiento gráfico con feldespato K^+ . El microclino euhedral aparece reemplazando a la albita y origina cristales idiomórficos, no ovoídes, de aspecto pseudorapakivi.

La biolita se encuentra generalmente alterada a clorita. En pequeñas cantidades aparecen epidoto, esmera y minerales opacos. Químicamente los granitos muestran bajos contenidos de MgO , TiO_2 , F_2O_3 , Al_2O_3 y moderadamente altos en SiO_2 . De acuerdo a Rivas (1985) estos granitos se ubican en el campo calcoalcalino.

Espesor: No se indica en la descripción original.

Extensión geográfica: Mendoza *et al.* (*op. cit.*) y Rivas (*op. cit.*) mencionan afloramientos de este granito en las áreas de los ríos Ventuari, Orinoco, Marieta y Guapuchi, en la región centro-occidental del Estado Amazonas.

Contactos: No se mencionan relaciones de campo ni en la descripción original de Mendoza *et al.*, (1977) ni en la de Rivas (1985).

Edad: La edad determinada en estos granitos por el método Rb/Sr en roca total isocroma es de 1534 ± 13 m.a., lo cual le da una edad Precámbrico Temprano (Barrios y Rivas, 1978, en prensa).

Correlación: Mendoza *et al.* (*op. cit.*) menciona similitud de este granito con el Granito de los Pijiguaos y con el Granito de Santa Rosalía. Barrios y Rivas (1978) determinaron una edad similar en el Granito de Parguaza. De acuerdo a la determinación de edad podría ser equivalente al "Granito Alcalino de la paragua, Martin B. (1968).

Geoquímica: Muestra relativos altos contenidos de CaO , Al_2O_3 , Sr y moderados a bajos contenidos de K_2O , Fe_2O_3 , Rb, K/Rb, Rb/Sr.

Geofísica: Las rocas son débil a moderadamente magnéticas.

Importancia económica: Estas rocas graníticas pueden ser fuentes probables para mineralizaciones de columbita-tantalita, ilmenita, casiterita.

© J. H. Rios, 1997

Referencias

Barrios. F. y D. Rivas, 1978. *Algunas edades radiométricas por el método K-Ar, de rocas del Territorio Federal Amazonas* (en prensa).

Mendoza, V.; L. Moreno, F. Barrios, D. Rivas, J. Martínez, P.Lira, G. Sardi y S. Ghesh, 1977. Geología de la parte norte del Territorio Federal Amazonas, Venezuela (Informe en Progreso). *V Cong. Geol. Venez.*, 1: 363-404.

Rivas, D., 1985. Geología de la sub-región Atabapo, Territorio Federal Amazonas, Venezuela. *I Simp. Amazo.*, Puerto Ayacucho, 12-134.

Enviar Comentarios



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)