


MOSQUITO, Miembro (Formación Agua Salada)

INFORMAL



NEOGENO (Mioceno Medio)

Estado Falcón

Referencia original: A. L. Payne, 1951, p. 1854.

El nombre originalmente por Payne (1951), como Formación Mosquito, para una unidad expuesta al sur del campo de Cumarebo comprendida entre las arenas de Las Lomas, tope de su Formación Ricoa y la Formación Caujarao. Payne (1951) subdividió esta formación en un intervalo inferior lutítico sin nombre y dos miembros superiores equivalentes laterales uno del otro: Caliza de Dividive y Arenas de San Francisco. Tanto Weingeist como Dusenbury (1956), en LEV I, emplearon el nombre de Formación Socorro para esta unidad y modificaron al rango de la Formación Mosquito a miembro inferior de la Formación Socorro en esta región, criterio seguido desde entonces en la literatura geológica.

Giffuni *et al.* (1992) sustituyen el nombre de Formación Socorro en el área de Cumarebo por el de Formación Agua Salada según el concepto de Díaz de Gamero (1985b). La Caliza de Dividive y las Arenas de San Francisco quedarían, por tanto, como unidades locales dentro de la Formación Agua Salada. De igual forma, el miembro inferior lutítico de la Formación Mosquito de Payne (1951), correspondería al intervalo entre las arenas de Las Lomas y las arenas de San Francisco o la caliza de Dividive.

Se recomienda considerar la Formación o Miembro Mosquito como informal.

La unidad tiene su sección tipo en la quebrada El Mosquito, a unos 8 km al suroeste del campo de Cumarebo y consiste de unos 1.000 m de arcillas y lutitas con algunas capas de margas micro y macrofósilíferas. Aquí, la unidad termina en la Caliza de Dividive, mientras que más al este lo hace en las Arenas de San Francisco.

Véase [AGUA SALADA, Formación](#); [SOCORRO, Formación](#).

© M. L. Díaz de Gamero, 1997

(Actualizado por: María Lourdes Díaz de Gamero, agosto 1997)

Referencias

Díaz de Gamero, M. L., 1985b. Estratigrafía de Falcón nororiental, *VI Congr. Geol. Venez. Mem.*, 1: 454-502.

Giffuni, G., M. L. Díaz de Gamero y M. Castro Mora, 1992. Análisis secuencial del Neógeno de la región de Cumarebo, Falcón nororiental, basado en estudios bioestratigráficos, *Soc. Venezolana Geol., Bol.*, 46:7-15.

Ministerio de Minas e Hidrocarburos, 1956. Léxico Estratigráfico de Venezuela. *Bol. Geol. Pub. Esp.*, 1, 728 p.

Payne, A. L., 1951. Cumarebo oil field, Falcón, Venezuela, *Amer. Assoc. Petrol. Geol., Bull.*, 35(8): 1850-1878.

Bibliografía de Léxicos Anteriores

Gonzalez de Juana, C., 1937-a. Geología general y estratigrafía de la región de Cumarebo, Estado Falcón, *Bol. Geol. y Min.* 1(2-4): 197-217.

González de Juana, C., 1937-b. General geology and stratigraphy of Cumarebo area, State Falcón. *Bol. Geol. y Min.* 1(2-4): 187-205 (ed. en inglés).

Hodson, F., 1926. Venezuelan and Caribbean Turrillias, with a list of Venezuela type stratigraphic localities, *Bull. Amer. Paleont.*, 11(45): 173-220.

Liddle, R. A., 1946. *The Geology of Venezuela and Trinidad*, 2nd. Ed., Paleont. Res. Inst., Ithaca, N.Y., 890 p.

Senn, A., 1935. Die stratigraphische Verbreitung der Tertiären Orbitoiden, mit spezieller Berücksichtigung ihres Vorkommens in Nord-Venezuela und Nord-Marokko, *Eclog. Geol. Helv.*, 28(1): 51-113 y 369-373.

Sociedad Venezolana de Ingenieros de Petróleo, 1963. Aspectos de la industria petrolera en Venezuela. Congr. Venez. Petról. I, Caracas, 1962, 850 p. (Cuadro de Correlación entre p. 188-189). Reimpreso en: *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról.*, Bol. Inform., 1963, 6(11); 1964, 7(5).

Wiedenmayer, C., 1937. Informe geológico sobre los depósitos carboníferos de Coro, Distrito Miranda, Estado Falcón, *Bol. Geol. y Min.*, 1(1): 65-81.

Williston, S. H. y Nichols, C. R., 1928. The Geology of Venezuela and Trinidad, by R. A Liddle, Review, *Amer. Assoc. Petrol. Geol., Bull.*, 12(4): 445-451.

Enviar Comentarios

		
2a Edicion LEV	1st Ed. English	Comentarios Recibidos



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)