


**PALEOZOICO TARDIO**

Estados Táchira, Mérida y Trujillo

Referencia original: P. Christ, 1927, p. 397.

Consideraciones históricas: Originalmente usado por Christ (1927) con el nombre de Serie de Mucuchachí. Oppenheim (1937) utilizó la misma terminología. Kehrer (1938) señaló la conveniencia de considerar la Serie Río Momboy, de Liddle (1928), como perteneciente a la misma secuencia litológica que la Serie Mucuchachí de Christ. Kündig (1938) empleó el nombre Serie Mucuchachí en su texto en inglés, y el de grupo en la versión en castellano (1938). Sutton (1946) y González de Juana (1951), citaron la unidad con rango de grupo. Pierce (1960) la asignó al Devónico y la subdividió en tres formaciones: Remolino, Libertad y Río Momboy, en orden ascendente, cuyas secciones tipo fueron descritas por Pierce *et al.* (1961). Posteriormente, las Compañías Shell y Creole (1964) indicaron que las unidades asignadas al Grupo Mucuchachí, son de edad, en parte más antigua o más joven que el Devónico, y no son cartografiables, por cuya razón, recomendaron el rechazo de los nombres de Pierce (1960) y asignaron rango formacional a Mucuchachí.

Localidad tipo: Camino de Santa Bárbara de Barinas a Mucuchachí, en los alrededores del pueblo de Mucuchachí, estado Mérida, hoja 5939, escala 1:100.000 de Cartografía Nacional.

Descripción litológica: La unidad es una secuencia de pizarras laminadas y pizarras limosas, de color negro a gris verdoso, carbonosas y en parte filíticas, con buen clivaje; es común la presencia de pirita, la cual frecuentemente reemplaza a los fósiles. Con las pizarras se intercalan delgadas franjas de areniscas impuras, laminadas, duras, de color claro, las cuales localmente muestran desarrollos masivos (cuarcitas). Shagam (1969) distingue la facies aricagua o cases con cuarcitas, conglomerados y calizas (Marechal, 1983). Useche y Fierro (1969) incluyen pizarras, filitas, cuarcitas y calizas. En la región de Bailadores, estado Mérida, se han identificado manifestaciones de tipo volcánicas ácidos, con mineralizaciones de Cu, Zn, y Pb. (Sifontes y García 1973, *et al.* 1977, Escarrachi, 1980).

Espesor: Las compañías Shell y Creole (1964), estimaron un espesor promedio de 5.000 m. Marechal (1983), citando datos de las mismas compañías, menciona espesores comprendidos entre 3.000 y 4.500 m.

Extensión geográfica: La unidad aflora en los andes venezolanos, desde las cercanías de San Cristóbal, Estado Táchira, en extensas zonas de los estados Mérida y Trujillo.

Expresión topográfica: Donde afloran las cuarcitas y calizas, forma resaltos con escarpes muy pronunciados.

Contactos: La unidad suprayace discordantemente al complejo basal. El contacto superior es de falla o discordante con otras unidades del Paleozoico Superior, y Mesozoico (Formación La Quinta y Formación Río Negro).

Fósiles: Las compañías Shell y Creole (1964) mencionaron restos de braquiópodos, bivalvos, criozoarios, corales y crinoideos dentro de la formación mas recientemente. Pfefferkorn (1977), cita la presencia de una megaflora, proveniente de la región de Mijará, estado Mérida, contentiva de: *Stigmara Ficoides* (raíz de licópodos arborescentes). *Lepidophylloides* (hojas de licópodos arborescentes), *Calamites* (esfenopsidas arborescentes) y tallos de *Pteridos Permas*.

Edad: En base a las faunas de invertebrados, y fundamentalmente a la flora fósil, la unidad se considera de edad Paleozoico Superior, Pensilvaniano.

Correlación: La formación sería correlacionable, litológicamente, con la Formación El Aguila, en sus miembros inferior (El Gavilán) y medio (El Balcón); con la Formación Los Torres y con la Formación Río Momboy, en su miembro inferior (Mocojó). Además podría ser correlacionable, en parte, con la Formación Cerro Azul, la cual, según Grauch (1975), posee fuertes semejanzas litológicas con la Formación Mucuchachí; por otro lado, Burkley (1976) obtuvo por isocronas Rb-Sr, sobre roca total, edades similares de Carbonífero Superior para las dos unidades Marechal 1983.

Paleoambientes: Shagam (1968), atribuye a la Formación Mucuchachí a una serie de tipo flysch, según García (1972) eso se tradujo en condiciones de depósitos más colmados y a gran profundidad. Sin embargo, las plantas fósiles de la región de Mijará, indican ambientes de pantanos y marismas.

Importancia económica: En la región al sur de Bailadores, Estado Mérida, la formación presenta importantes concentraciones de sulfuros masivos con mineralizaciones de cobre, plomo, zinc y plata, los cuales son económicamente explotables.

Sinonimia: La unidad es sinónima, en parte con la Serie o Grupo Mucuchachí, Kündig, (1938).

© O. Odreman y A. Useche C., 1997

Referencias

Burkley, L. A., 1976. Geochronology of the Central Venezuela Andes. *Ph. D. Thesis, Case Nester Reserve Univ.*, 150 p.

Christ, P., 1927. La coupe geologique le long du chemin de Mucuchachí a Santa Bárbara dans les andes venesueliennes. *Eclog. Geol. Helv.*, 20(3): 397-414.

Compañía Shell de Venezuela and Creole petroleum Corporation (1964). Paleozoic rocks of Mérida Andes, Venezuela. *Am. Ass. Petrol. Geol. Bull.*, 48(1): 70-84.

Escarrachi, R., 1980. *Geología, alteración, mineralización, geoquímica y génesis del yacimiento volcanogénico de sulfuros masivos de Las Tapias, Estado Mérida*. Inf. Ined. Min. Energía y Minas Dir. Geol., Caracas, 279 p.

García J. R., 1972. El Permo-Carbonífero en Venezuela. *Bol. Soc. Venez.*, 7(3): 203-214.

García, J. R., G. Canelon y Harder, 1977. Geología de la región al sur de Bailadores, Estado Táchira y Mérida. *Mem. V. Cong. Geol. Venez.* 1: 415-448.

González de Juana, 1951. Introducción a la geología de Venezuela: geología de los andes venezolanos y de la subcuenca del Lago de Maracaibo; las formaciones paleozoicas de Venezuela occidental. *Bol. Geol.*, Caracas, 1(1): 117-139.

Grauch, R. I., 1975. Geología de la Sierra Nevada al sur de Mucuchíes, andes Venezolanos: una región metamórfica de aluminosilicatos. *Bol. Geol.*, Caracas, 12(23): 339-441.

Harder, G. C., 1977. Geology and petrology of the Sierra Nevada and Mucuchachí formations, Veriguaca and Valle Negro regions, south of Bailadores, Venezuelan andes. *M. Sc Thesis, Mich. Techn Univ.* 94 p.

Kehrer, L., 1938-a. Algunas observaciones sobre la estratigrafía en el Estado Táchira. *Bol. Geol. y Min.*, Caracas, 2(2-4): 44-56.

Kehrer, L., 1938-b. Some observations on the stratigraphy in the states of Táchira and Mérida, S. W. Venezuela. *Bol. Geol. y Min.*, Caracas, 2(2-4): 44-55.

Kündig, E., 1938. Las rocas precretáceas de los Andes Centrales de Venezuela, con algunas observaciones sobre su tectónica. *Bol. Geol. y Min.* Caracas, 2 (2-3-4): 21-44.

Liddle, R. A., 1928. *The geology of Venezuela and Trinidad*. J. P. Macgowan, Fort Worth, Texas, 557 p.

Marechal, P. 1983. Les témoins de Chaîne hercynienne dans le noyau ancien des andes de Mérida (Vénézuéla). Structure et evolution tectonométamorphique. *Thèse de Doctorat de 3eme cycle. Université de Bretagne Occidentale*. Brest, 1983.

Oppenheim, V., 1937-a. Contribución a la geología de los andes venezolanos. *Bol. Geol. y Min.*, Caracas, 1(2-4): 25-45.

Oppenheim, V., 1937-b. Contribution to the geology of the Venezuelan Andes. *Bol. Geol. y Min.*, Caracas, 1(2-4): 25-43.

Pfefferkorn, H., 1977. Plant megafossils in Venezuelan and their use in geology. Me., *V Cong. Geol. Venez.*, 1: 407-414.

Pierce, G. R., 1960. Geología de la Cuenca de Barinas Mem. III. *Cong. Geol. Venez.* 1: 214-276.

Pierce, G. R.; C. C. Jefferson and W. R. Smith, 1961. Fossiliferous Paleozoic localities In. Mérida Andes, Venezuela. *Am. Ass. Petrol. Geol. Bull.*, 45 (3): 342-375.

Shagam, R., 1969. Geología de los andes merideños Inf. Inédito. *Min. Energía y Minas*. Dir. Geol., Div. Explor., Mérida, 50 p.

Sifontes, R. y E. García D., 1978 . Prospección geológica-mineral de la región de Bailadores-Guaraque, Estado Mérida (Resumen). Mem. II. *Cong. Latinoamericano Geol.*, Caracas, Pub. Esp. 7, 5: 3.690 3.700.

Sutton, F. A., 1946. Geology of Maracaibo basin, Venezuela. *Amer. Assoc. Petrol. Geol., Bull.*, 30(10): 1.621-1.741.

Useche, A. y I. Fierro, 1969. Geología de la región de Pregonero, estados Táchira y Mérida. *IV Cong. Geol. Venez.*, Caracas, 2: 963-998.

Bibliografía de Léxicos Anteriores

Arnold, H. C., 1966. Upper Paleozoic Sabaneta-Palmarito sequence of Mérida Andes, Venezuela. *Amer. Assoc. Petrol. Geol., Bull.*, 50(11): 2366-2387.

Liddle, R. A., 1946. *The geology of Venezuela and Trinidad*. 2nd. ed. Paleont. Res. Inst., Ithaca, New York, 890 p.

Sociedad Venezolana de Ingenieros de Petróleo, 1963. Aspectos de la industria petrolera en Venezuela. Congr. Venez. Petról. I, Caracas, 1962, 850 p. (Cuadro de correlación entre pág. 188-189). reimpreso en: Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról., Bol. Infom., 1963, 6(11); 1964, 7(5).

Enviar Comentarios

		
2a Edicion LEV	1st Ed. English	Comentarios Recibidos



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)