




TERCIARIO (Eoceno)

Estado Nueva Esparta

Referencia original: N. G. Muñoz, 1973.

Consideraciones históricas: Este nombre fue introducido por Muñoz (1973), quien señaló que las diferencias en litología y características sedimentarias, justifican el tratamiento de esta secuencia como una

unidad separada del Grupo Punta Carnero.

Localidad tipo: Como sección tipo de la formación, se ha establecido la que aflora en el área de Agua de Vaca-Punta Gorda-Salina de Pampatar, al norte-noreste de la unidad de Pampatar.

Descripción litológica: La sección tipo de la unidad está expuesta en el flanco norte de un sinclinal, con eje este-oeste. Comienza con un olistolito de ftanita en capas finamente estratificadas y laminadas, de unos 15 m de espesor, seguido por conglomerados de guijarros en matriz lutácea y por capas gruesas, gradadas, de conglomerados a areniscas, grauvacas de grano grueso y fino. Los conglomerados, incluso los que se encuentran gradados, exhiben mala selección de tamaño. La composición de los fragmentos es heterogénea, predominando los de rocas volcánicas extrusivas, cuarzo y ftanita. El resto de la sección está constituido por alternancias de areniscas grauvacas y lutitas, interrumpidas hacia la parte inferior por un intervalo de unos 100 m de espesor, de lutitas arenosas marrones, con bloques exóticos (mayormente olistolitos calcáreos) e intercalaciones finas de limolitas y areniscas grauváquicas; las lutitas y limolitas de este intervalo, poseen fractura astillosa característica. En toda la sección, son comunes las estructuras primarias de deslizamiento.

La formación presenta cambios locales de facies que se expresan en diferencias litológicas. Es así como en el flanco sur del sinclinal, la base de la unidad está constituida por conglomerados polimícticos, seguidos por un intervalo turbidítico de capas gruesas de grauvacas y calcarenitas de grano grueso, con estructuras de deslizamiento, relleno de canales y estratificación cruzada. La secuencia, sigue con conglomerados rellenando canales y un intervalo finamente estratificado de grauvacas, limolitas y lutitas, carente de secuencias turbidíticas, que pasa gradualmente a una secuencia monotonía recurrente de grauvacas y lutitas intercaladas, de carácter turbidítico, ocasionalmente con estructuras primarias de deslizamiento.

Espesor: Muñoz estima que el espesor de la formación en la sección tipo es de 1.000 m.

Extensión geográfica: La unidad, aflora en el extremo oriental de la isla de Margarita, en los alrededores de la ciudad de Pampatar, desde bahía de Moreno por el sur, hasta la laguna de Agua de Vaca por el norte.

Contactos: La secuencia, yace en contacto discordante sobre la Formación Los Robles. El tope de la secuencia está truncado por erosión, o cubierto por aluviones recientes.

Fósiles: La fauna de la Formación Pampatar es escasa. Sin embargo, entre los microfósiles encontrados, Muñoz menciona *Globigerina* sp., *Discocyclus* sp., *Operculinoides* sp., *Eoconuloides* sp. y *Globorotalia* sp., además de micromoluscos, fragmentos de equinoideos y algas (*Lithothamnium* sp.) En los conglomerados de Punta Moreno, se han encontrado macromoluscos como *Turritella* sp. y *Ostrea* sp. y restos de pelecípodos. El contenido faunal de esta formación, se considera mezclado y retrabajado por corrientes de turbidez.

Edad: Eoceno medio-tardío.

Correlación: La facies de flysch arenoso de la Formación Pampatar, es un equivalente lateral del flysch calcarenítico de la Formación Punta Carnero. Es también comparable con la sección eocena del subsuelo de la isla de Cubagua y, en su parte basal, con los conglomerados de grano grueso encontrados en el subsuelo de la subcuenca de Cubagua, en el margen continental de Venezuela. Ha sido correlacionada también con las formaciones Caratas, de Venezuela oriental, Paují y Mene Grande del occidente de Venezuela, y Navet, de Trinidad.

Paleoambientes: La sección se depositó en ambiente marino profundo, en condiciones de pronunciada inestabilidad tectónica.

Referencias

Muñoz, N. G., 1973. Geología Sedimentaria del Flysch Eoceno de la Isla de Margarita (Venezuela). *GEOS*, (20): 5-64.

Enviar Comentarios



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)