




TERCIARIO (Eoceno)

Estado Nueva Esparta

Referencia original: F. de Rivero, 1956, Léxico Estratigráfico de Venezuela, p. 534.

Consideraciones históricas: El nombre fue publicado por primera vez por Rivero (1956), para designar la unidad superior del Grupo Punta Carnero. Kugler (1957) y Taylor (1960), consideraron al intervalo completo como Formación Punta Carnero, dividida en cinco miembros. Jam y Méndez (1962), establecieron la equivalencia de estos miembros con las formaciones del grupo. González de Juana (1968), aportó información adicional, y González de Juana *et al.* (1980), describieron el grupo y sus formaciones en detalle. Muñoz (1973), describe el intervalo correspondiente a la Formación Punta Mosquito, como la parte superior de la Formación Punta Carnero, aunque sin considerarla como subunidad separable.

Localidad tipo: La sección tipo se encuentra en Punta Mosquito, en la costa sur de la isla de Margarita, al sur de la laguna Las Marites, 7 km al suroeste de Porlamar, distrito Mariño, estado Nueva Esparta.

Descripción litológica: La base de la unidad está integrada por calizas orbitoidales grises, arenosas, en capas de hasta un metro de espesor, resistentes a la erosión, intercaladas con lutitas arenosas, capas delgadas de arenisca laminada calcárea y lentes conglomeráticas. En la parte superior, predominan lutitas y limolitas oscuras laminadas, micáceas y ocasionalmente ligníticas, con intercalaciones de areniscas finas, gris-verdoso, frecuentemente calcáreas; esporádicamente se presentan capas delgadas de caliza arenosa orbitoidal. González de Juana *et al.* (*op. cit.*), indican que la Formación Punta Mosquito, representa una facies más clástica que El Dátil infrayacente. Muñoz (*op. cit.*), considera que la secuencia aflorante en Punta Mosquito, es una facies de flysch calcarenítico, muy similar a la de la Formación Punta Carnero, en el área de Las Bermúdez-El Manglillo. De acuerdo a este autor, en Punta Mosquito, la sección está constituida por capas gruesas de calizas arrecifales bioclásticas, de grano muy grueso, intercaladas con lutitas pelágicas y biocalcilutitas laminadas; varios intervalos presentan numerosas estructuras de deslizamiento intraformacional.

Espesor: Jam y Méndez (*op. cit.*) y González de Juana *et al.* (*op. cit.*), señalan un espesor mínimo de 425 m, ya que el tope está truncado por erosión.

Extensión geográfica: La sección aflora en el área de Las Marites, al noroeste de El Manglillo y esporádicamente más al este.

Contactos: La unidad suprayace transicionamente a la Formación El Dátil. Su contacto superior es discordante bajo las formaciones La Tejita y El Manglillo, o bajo aluviones recientes.

Fósiles: La microfauna de la sección es abundante. Rivero, señaló los siguientes orbitoides: *Lepidocyclina* (*Pliolepidina*) *pustulosa*, *Operculinoides trinitatensis* y *Discocyclina* (*Asterocyclina*) *cf. D. asterisca*. Jam y Méndez (*op. cit.*) mencionan las especies *Globigerina orbiformis*, *Gumbellina goodwini*, *Hastigerinella eocénica*, *Spiroplectamina trinitatensis*, *Globorotalia aragonensis*, *Anomalina alazanensis* var. *spissiformis*, *A. bilateralis*, *Globorotalia centralis*, *G. crassata*, *Discocyclina* sp., etc.

Según Castro (1997, comentarios enviados al CIEN) el conjunto floral está constituido, en la base, por *Reticulofenestra umbilica*, *Reticulofenestra* spp., *Sphenolithus celsus*, *Discoaster barbadiensis*, *Discoaster* cf. *nodifer*, *Sphenolithus* sp., *Sphenolithus pseudoradians*, *Discoaster deflandrei*, *Discoaster* sp., *Sphenolithus predistentus*, *Coccolithus pelagicus*. Hacia el tope, se observa *Reticulofenestra* spp., *Reticulofenestra minuta*, *Dictyococcites bisecta*, *Coccolithus pelagicus*, *Coccolithus eopelagicus*, *Ericsonia cava*, *Ericsonia* sp., *Reticulofenestra umbilica*, *Sphenolithus pseudoradians*, *Sphenolithus* sp., *Discoaster barbadiensis*, *Discoaster deflandrei*, *Cyclicargolithus floridanus*, *Helicosphaera compacta*, *Discoaster* sp., *Helicosphaera euphratis*, *Helicosphaera reticulata*.

Edad: Bermúdez y Gámez (1966), indican que la sección corresponde a la zona de *Truncorotaloides rohri*, del Eoceno Medio Tardío.

Hacia la base el conjunto floral indica una edad Eoceno Tardío, entre las zonas NP18 y NP20, zonas de *Chiasmolithus oamaruensis* y *Sphenolithus pseudoradians* de Martini 1971. En el tope el conjunto floral presente es del Eoceno Tardío parte mas superior, zona NP20, Zona de *Sphenolithus pseudoradians* de Martini, 1971, (Castro, *op. cit.*).

Correlación: La sección es equivalente a parte de la Formación Pampatar, del extremo oriental de la isla de Margarita, y posiblemente, a la sección del Eoceno encontrada en el subsuelo de la isla de Cubagua. Ha sido correlacionada también con la Formación Caratas del oriente de Venezuela, y con las formaciones Paují y Mene Grande de Venezuela occidental, y con la Formación Navet de Trinidad.

Paleoambiente: Muñoz (*op. cit.*), señala que el intervalo, como el resto de la Formación Punta Carnero, fue depositado en un ambiente marino profundo, de mar abierto, bajo un régimen tectónico inestable.

© **M. I. Muñoz, 1987**

Referencias

Bermúdez, P. J. y H. A. Gámez, 1966. Estudio paleontológico de una sección del Eoceno. *Soc. Cienc. Nat. La Salle*, Mem., 26(75): 205-259.

González de Juana, C., 1968. Guía de la excursión geológica a la parte oriental de la Isla de Margarita (Estado Nueva Esparta). *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról.*, Guía, 30 p.

González de Juana, C.; J. Iturralde de Arozena y X. Picard, 1980. *Geología de Venezuela y de sus Cuencas Petrolíferas*. Caracas, Ed. Foninves, 2 tomos. 1021 p.

Jam, P. y A. Méndez, 1962. Geología de las islas de Margarita, Coche y Cubagua. *Soc. Cienc. Nat. La Salle*, Mem., 22(61): 51-93.

Kugler, H. G., 1957. Contribution to the geology of the islands Margarita and Cubagua, Venezuela. *Geol. Soc. Amer.*, Bull., 68(5): 555-566.

Ministerio de Minas e Hidrocarburos, 1956. Léxico Estratigráfico de Venezuela, *Bol. Geol. Pub. Esp.*, 1, 728 p.

Muñoz, N. G., 1973. Geología sedimentaria del flysch eoceno de la isla de Margarita (Venezuela). *Revista GEOS*. Caracas, 20: 5-64.

Taylor, G. C., 1960. Geología de la Isla de Margarita, Venezuela. *III Congr. Geol. Venez.*, Caracas, 1959, Mem., 2: 838-893.

Enviar Comentarios

	
2a Edición LEV	Comentarios Recibidos



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)