




PRECAMBRICO

Estado Bolívar

Referencia original: Newhouse y Zuloaga, 1929, p. 797.

Consideraciones históricas: El término Grupo Pastora fue empleado formalmente por Zuloaga y Tello (1939) para sustituir el original de Newhouse y Zuloaga (1929). No obstante, autores posteriores

mantuvieron esta última versión. Las rocas habían sido descritas anteriormente por Duparc (1922) como "rocas verdes" y por Zuloaga (1930; 1934) como tobas andesíticas verdes depositadas subacuáticamente. Descripciones posteriores fueron las de Martín B. y Bellizzia (1959) y Korol (1965) quien subdividió la unidad en las formaciones Yuruari, El Callao y Caballape, en secuencia ascendente.

Menéndez (1968; 1972) a partir del estudio detallado de la localidad tipo de la unidad, en la región de Guasipati, estado Bolívar, distinguió una unidad de rocas volcánicas máficas en su parte inferior y una unidad de rocas volcánicas félsicas y sedimentarias asociadas en su parte superior. La unidad máfica la identificó como Grupo Carichapo, constituida por las Formaciones El Callao y Cicapra, y la félsica como Formación Yuruari, y elevó la unidad al rango de Supergrupo, excluyendo a la Formación Caballape, que señaló como separada del mismo por una discordancia angular. Adicionalmente, Menéndez (1994) diferenció en la base del Grupo Carichapo a la Formación Florinda.

A partir de los trabajos de Benaím (1972; 1974) las unidades del Supergrupo han sido identificadas, fuera del cinturón de rocas verdes de Guasipati, hacia el este hasta la frontera con Guyana y hacia el sur hasta las cabeceras del río Cuyuni, en los cinturones de rocas verdes de La Introducción y de El Dorado (Menéndez, 1994; 1995), donde infrayace discordantemente al Grupo Botanamo.

Véanse [CARICHAPO, Grupo](#); [BOTANAMO, Grupo](#); [FLORINDA, Formación](#); [EL CALLAO, Formación](#); [CICAPRA, Formación](#); [YURUARI, Formación](#) y [CABALLAPE, Formación](#).

© M. E. M., 15 de Octubre de 1995

Referencias

Korol, B., 1965. Estratigrafía de la Serie Pastora en la región Guasipati-El Dorado. (Presentado Cong. Cent. Col. Ing. Venez., 1961). *Bol. Geol.*, Caracas, 7(13): 3-17.

Martín Bellizzia, C., 1968. Edades isotópicas de rocas venezolanas. *Bol. Geol.*, Caracas, 9(19): 356-380.

Martín Bellizzia, C. y A. Bellizzia, 1959. ?????????????????????????????

Menéndez, V. de V., A., 1968. Revisión de la estratigrafía de la Provincia de Pastora según el estado de la región de Guasipati, Guayana Venezolana. *Bol. Geol.*, Caracas, 9(19): 309-338.

Newhouse, W. H. y G. Zuloaga, 1929. Gold deposits of the Guayana highlands. *Econ. Geol.*, 24(8): 797-810.

Zuloaga, G., 1930. Geología general de la Guayana venezolana. *Rev. Col. Ing. Venez.*, 6(69-74): 466-475.

Zuloaga, G., 1934. Geología de los depósitos de hierro en la Sierra de Imataca. *Rev. Col. Ing. Venez.*, 12(104): 1181-1189.

Zuloaga, G. y M. Tello, 1939. Exploración preliminar de la Sierra de Imataca. *Rev. Fomento*, Caracas, 3(19): 397-430.

Bibliografía de Léxicos Anteriores

Cohen, A., 1953. *De ontwikkeling van Geologisch Kaart van Suriname, Geologie en Mijnbouw, noroeste serie*, 16 e jaarjang, p. 142-151.

Duparc, L., 1922. Les roches vertes et les filons de quartz aurifère du Callao au Vénézuéla. *Schweiz. Min. Pet. Mitt.*, Bd. II, p. 1-68.

Kalliokoski, J., 1965-a. Geology of north-central Guayana Shield, Venezuela. *Geol. Soc. Amer., Bull.*, 76(9): 1027-1050. Resumen (1965) en: *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról., Bol. Inform.*, 8(1): 328-329.

Kalliokoski, J., 1965-c. Geología de la parte norte-central del Escudo de Guayana, Venezuela. *Bol. Geol.*, Caracas, 7(13): 29-104.

Gansser, A., 1954. The Guiana Shield, (S. America), *Eclog. Geol. Helv.*, 47(1): 77-112.

McCandless, G. L., 1965. Reconocimiento geológico de la región noroccidental del Estado Bolívar. *Bol. Geol.*, Caracas, 7(13): 19-28.

Maguire, B., 1955. Cerro de la Neblina, Amazonas, Venezuela, *Geog. Rev.*, 46(1): 27-51.

Mencher, E., H. J. Fichter; H. H. Renz; W. E. Wallis; H. H. Renz; J. M. Patterson and R. H. Robie, 1953. Geology of Venezuela and its oil fields, *Am. Assoc. Petrol. Geol. Bull.*, 37(4): 690-777.

Rubio, E., Martin Bellizzia, C., Bellizzia, A., and Laforest, R., 1952. Geología, paragénesis reservas de los yacimientos de hierro de Imataca en Venezuela, In: *Symposium sur les gisements de fer du monde*, XIX Congrès Géologique International (Alger), 1: 477-498.

Stockley, G. M., 1955. The geology of British Guiana and the development of its mineral resources, *Geol. Survey Bull.*, N° 25 (Georgetown, Demerara), 102. p.

Enviar Comentarios

		
2a Edicion LEV	1st Ed. English	Comentarios Recibidos



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)