




CRETACICO TEMPRANO

Estado Sucre

Referencia original: C. González de Juana, N. G. Muñoz y M. Vignali, 1965, p. 264-265.

Este nombre fue introducido por González de Juana *et al.* (1965) para designar la unidad intermedia de la Formación Cariaquito. El

miembro aflora típicamente en la quebrada Patao, al este de Puerto de Hierro, península de Paria, Estado Sucre y se extiende a lo largo de una faja cercana a la costa sur de Paria oriental, donde se destaca por la topografía prominente que soportan las calizas. Es un grueso intervalo de calizas con una capa suprayacente de yeso e intercalaciones menores de esquistos. En la sección tipo los tramos inferior y superior son de calizas compactas, separadas por un tramo intermedio de calizas finamente estratificadas. La capa de yeso no se ha reconocido al oeste de la ensenada de Cumaca. Su espesor en la sección tipo es de 300 metros; el espesor del yeso varía entre 20 y 120 metros. La unidad es concordante sobre el Miembro Guatay, y por debajo del Miembro Yacua.

Entre los fósiles que contiene se ha identificado *Thecosmilia cumanensis*, *Cladophyllia* cf. *stewartae* y espinas y placas de *Pseudocidaris* sp., que determinan su edad Neocomiense-Barremiense. El miembro es correlativo de las calizas de Maraval de Trinidad.

Véase [CARIAQUITO, Formación](#).

Referencias

González de Juana, C., H. G. Muñoz y M. Vignali, 1965. Reconocimiento geológico de la parte oriental de Paria. *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról.*, Bol. Inform., 8(9): 255-279.



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)