




PALEOGENO-NEOGENO (Oligoceno-Mioceno Temprano)

Estado Falcón

Referencia original: F. Hodson, 1926, p. 174.

Consideraciones históricas: Hodson (1926) propuso el término "Serie de Los Patiecitos" para designar una secuencia de areniscas conglomeráticas, lutitas negras y calizas silíceas expuestas en la

quebrada Los Patiecitos en el flanco norte de la serranía de San Luis, cerca del pueblo de Los Alambiques. Liddle (1928) incluyó esta sección en la Formación San Luis. Senn (1940) la atribuyó al Oligoceno medio y junto con las arenas de San Juan de la Vega la considera infrayacente a la Formación San Luis y suprayacente a la Formación Tacal. Wheeler (1960, 1963) y Díaz de Gamero (1977) consideran que la Formación Patiecitos representa una facies atrás del arrecife y la asignan edad Oligoceno y tentativamente Oligoceno Tardío-Mioceno Temprano, respectivamente.

Localidad tipo: La unidad tiene su localidad tipo en la quebrada Los Patiecitos, en el flanco norte de la serranía de San Luis, distrito Miranda, estado Falcón, Hoja 6249, esc. 1:100.000, Cartografía Nacional.

Descripción litológica: Wheeler (1960, 1963) describe la Formación Patiecitos como una secuencia de lutitas interestratificadas con areniscas y algunas calizas; las lutitas predominan en la parte inferior de la formación, pero la proporción de arenas incrementa gradualmente hacia la parte superior. Las calizas se encuentran más frecuentes hacia el tope. Las lutitas son de color gris oscuro y tienen fractura en bloques. Las areniscas son frecuentemente de tipo "sal y pimienta", de grano fino a grueso y de colores gris, gris blanquecino y marrón. En la parte superior de la formación contienen lentes conglomeráticos. Las calizas generalmente son de colores grises, fosilíferas, arenosas y se encuentran en capas delgadas hasta capas de espesor mediano. Hacia el tope de la formación se encuentran frecuentes capas gruesas de calizas del tipo de las calizas de San Luis.

Esteves y Villalta (1989) describen la unidad al oeste de la sección tipo como subdividida en dos partes o miembros. La sección inferior se caracteriza por lutitas laminadas de color oscuro intercaladas con areniscas pardas y negras, ocasionalmente fosilíferas y bioturbadas, y cantidades menores de limolitas. La parte superior tiene, además de lutitas y areniscas como las anteriores, areniscas conglomeráticas, calizas fosilíferas y bioturbadas grises, conglomerados de cantos de corales, de 5 a 20 cm de diámetro, además de algunos niveles de fragmentos de corales y ostreidos en matriz arcillosa.

Espesor: El espesor total de la formación se desconoce. Wheeler (1960, 1963) midió 575 m en una sección incompleta cerca de Patiecitos. Esteves y Villalta (1989) midieron un máximo de 685 m en sección incompleta, al sur de Chuchure.

Extensión geográfica: La unidad aflora a lo largo del flanco norte de la serranía de San Luis y se acuña al este y oeste. Hacia el norte la formación se acuña contra la antigua área positiva de Paraguaná.

Expresión topográfica: Las areniscas de la Formación Patiecitos forman cuestras y contracuestras características del tipo "dientes de sierra" que se pueden seguir fácilmente en fotografías aéreas y en el campo.

Contactos: El contacto inferior no se ha observado. La unidad se postula suprayacente a la Formación El Paraíso y/o quizás a rocas del Eoceno (Senn, 1940). El contacto superior es concordante con parte de la Formación San Luis, y más hacia el norte desaparece la cuña de la Formación San Luis y la Formación Guarabal descansa sobre la Formación Patiecitos, con un contacto abrupto que puede ser localmente discordante, como en el área de Guarabal, (Wheeler, 1960, 1963).

Fósiles: La unidad contiene macroforaminíferos. Wheeler (1960, 1963) cita *Operculinoides bullbrooki* y *O. semmesi* en las calizas macizas de la parte superior de la formación. La fauna en las lutitas es escasa y no ha sido estudiada adecuadamente.

Edad: La edad no ha sido determinada con toda precisión (Díaz de Gamero, 1989). Basado en los foraminíferos béticos, Wheeler (1960, 1963) le asigna edad Oligoceno y Díaz de Gamero (1989) la restringe al Oligoceno

Tardío-Mioceno Temprano.

Correlación: La Formación Patiecitos hacia el sur pasa gradualmente a la Formación San Luis; hacia el este y oeste se interdigita con las formaciones Pecaya y Pedregoso. Hacia el norte la formación se acuña contra la antigua tierra de Paraguaná, Wheeler (1960, 1963). Según Díaz de Gamero (1989) se correlaciona con la Formación Agua Clara.

Paleoambientales: La Formación Patiecitos se considera como facies de relleno entre el arrecife de San Luis y la costa de Paraguaná, Wheeler (1960, 1963) y Díaz de Gamero (1989). Esteves y Villalta (1989) interpretan un ambiente de laguna pobremente oxigenada para la parte inferior de la formación, que pasa hacia arriba a condiciones de laguna normalmente oxigenada, con acarreo de tormenta desde el arrecife que se desarrollaba al sur (arrecife de San Luis).

Importancia económica: Las areniscas de la Formación Patiecitos constituyen un importante acuífero en el flanco norte de la serranía de San Luis. Localmente se encuentran impregnaciones de hidrocarburos.

© **W. Scherer, 1997**

(Actualizado por: María Lourdes Díaz de Gamero, agosto 1997)

Referencias

Esteves, J. y E. Villalta, 1989. Estratigrafía de una zona ubicada entre Sabaneta y Coro, distrito Miranda, estado Falcón, Trabajo Especial de Grado, Universidad Central de Venezuela, 123 p., Inédito.

Ministerio de Minas e Hidrocarburos, 1956. Léxico Estratigráfico de Venezuela. *Bol. Geol. Publ. Esp. 1*, 728 p.

Díaz de Gamero, M. L., 1989. El Mioceno Temprano y Medio de Falcón Septentrional. *Jornadas 50 Aniversario Escuela de Geología*, UCV.

Hodson, F., 1926. Venezuelan and Caribbean Turrיתellas, *Bull. Am. Paleont.*, 11(45): 170-220.

Liddle, R. A., 1928. *The geology of Venezuela and Trinidad*, J. P. MacGowan, Fort Worth, Texas, 552 p.

Senn, A., 1940. Paleogene of Barbados and its bearing on history and structure of the Antillean-Caribbean region, *Am. Assoc. Petrol. Geol., Bull.*, 24(9): 1548-1610.

Wheeler, C. B., 1960, Estratigrafía del Oligoceno y Miocono inferior de Falcón occidental y nororiental, *III Congr. Geol. Venez.*, Mem, 1: 407-465.

Wheeler, C.B., 1963. Oligocene and lower Miocene stratigraphy of Western and Northeastern Falcón Basin, Venezuela. *Bull. AAPG*, 47(1): 35-68.

Enviar Comentarios

		
2a Edicion LEV	1st Ed. English	Comentarios Recibidos



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)