




TERCIARIO (Eoceno medio)

Trinidad

Referencia original: H. M. Bolli, 1957-c, p. 158, 159.

Esta zona del Eoceno medio fue definida en la Formación Navet de Trinidad por Bolli (1957-c), a base de la extensión vital de la especie titular, que Lamb (1964-b) reconoció en la Formación Caratas de Venezuela oriental. Esta zona se identifica en la parte superior de la Formación Paují y en la Formación Mene Grande de Venezuela occidental (Walton, 1966; Furrer, 1967).

Referencias

Bolli, H. M., 1957-c. Planktonic foraminifera from the Oligocene-Miocene Cipero and Lengua formations of Trinidad, *B.W.I. U.S. Nat. Mus., Bull.*, (215): 97-123.

Furrer, M. A., 1967. The depositional environment of the Mene Grande Formation. *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról.*, Bol. Inform., 10(7): 192-195.

Lamb, J. L., 1964-b. The geology and paleontology of the rio Aragua surface section, Serranía del Interior, State of Monagas, Venezuela. *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról.*, Bol. Inform., 7(4): 111-123.

Walton, W. M., 1966. Contributions of the AVGMP Maracaibo Basin Eocene Nomenclature Committee. II. The Paují and Mene Grande formations. *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról.*, Bol. Inform., 9(12): 325-337.

Enviar Comentarios



**Comentarios
Recibidos**



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)

Esta pagina ha sido visitada  veces