

CRETACICO TARDIO

Colombia

Referencia original: J. A. Cushman y H. D. Hedberg, 1941, p. 79-80.

Cushman y Hedberg (1941) establecieron tres zonas faunales en la sección lutítica del Cretácico Tardío, expuesta en la Concesión Barco, departamento Santander del Norte, Colombia, en la parte limítrofe con Venezuela. La Zona de *Pullenia cretacea* es la más antigua; en esta región comprende los dos tercios inferiores de la Formación Colón. Cushman y Hedberg mencionaron las siguientes especies como características de esta zona: *Pullenia cretacea*, *Gyroidina globosa*, *Siphogenerinoides cretacea*, *Haplophragmoides flagleri*, *Dorothia* cf. *filiformis*. La zona se reconoce en todo el occidente de Venezuela y en las regiones adyacentes de Colombia. (Petters, 1955).

Referencias

Cushman, J. A. y H. D. Hedberg, 1941. New Oligocene-Miocene foraminifera from Venezuela, *Cushman Lab. Foram. Res.*, Contrib., 17-1(224): 1-27.

Petters, V., 1955. Development of Upper Cretaceous foraminiferal faunas in Colombia. *Jour. Paleont.*, 29(2): 212-225.

Enviar Comentarios



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)

Esta pagina ha sido visitada  veces