

TERCIARIO (Paleoceno)

Estado Anzoátegui

Referencia original: V. Campos y O. Osuna, 1977-a, p. 456.

Consideraciones históricas: Campos y Osuna (1977-a, 456) mencionaron que Osuna (1974, informe inédito) describió las "Capas del Río Chavez" como "un intervalo básicamente calcáreo-silíceo, con estratificación delgada y gran semejanza litológica con el Grupo Guayuta y que aflora en casi todo el frente tectónico de las montañas de Guárico, Miranda y Anzoátegui, en asociación con el flysch lutáceo de la Formación Guárico." Propusieron como localidad tipo el área del río Chavez, donde Osuna (1974, fide Campos y Osuna, 1977-a) describe la repetición de este intervalo como consecuencia de plegamiento isoclinal y de fallas de corrimientos....." Campos *et al.* (1980) propusieron elevar el intervalo al rango de formación.

Campos y Osuna (1977-a) separaron la formación en tres intervalos litológicos: 1) un intervalo inferior compuesto de 15 m de lutitas calcáreas negras con concreciones de caliza negra, fétida, conglomerática, no fosilífera y pirítica, y calizas afaníticas negras, bituminosas y piríticas. Los autores afirman que este intervalo difiere de la Formación Querecual "por la composición de sus concreciones: las de Querecual son fosilíferas, mientras las "Capas de Río Chavez" no bajan del Campaniense....."; 2) un intervalo medio con 50 m de intercalaciones delgadas de ftanita negra, limolitas grises silíceas y algunas lutitas limosas gris oscuras y laminadas. "Este nivel ha sido confundido con la Formación San Antonio, de la cual se diferencia por ausencia de material arenáceo"; 3) un intervalo superior con 35 m de calizas afaníticas y limolitas calcáreas, de color gris claro con bandas negras y algunos niveles conglomeráticos con fragmentos de ftanita. Citan a Bermúdez (informe inédito), quien identificó la siguiente fauna arenácea del Paleoceno: *Ammodiscus* sp., *Rzehakina epigonalata*, *Barkerina* sp., *Plectibna* sp., *Psammosiphorella* sp., *Hormosina* sp., *Glomospira gordialis*, *Anomalina* sp., y *Neoponides* sp. También, citan a Macsotay (inédito), quien identificó a los icnofósiles *Zoophycos*, *Scalarituba* y *Tomuculum*. Estiman un espesor de unos 100 m en la quebrada La Guairita y contactos concordantes con las formaciones Guárico (suprayacente) y La Guairita (infrayacente).

Campos *et al.* (1980) opinaron que este intervalo es correlativo, parcial o total, con las formaciones Guárico (facies del río Orituco), La Soledad, La Guairita, El Guapo y Vidoño.

El suscrito recomienda que el término "Formación Río Chavez" se considere como inválido hasta tanto se compruebe su edad; se elimine la posibilidad de que el intervalo se compone de varias cuñas de falla, y se compruebe su homogeneidad litológica a lo largo de la frente de montaña.

© G. D. Kiser, 1997

Referencias

Campos, V. y S. Osuna, 1977-a. Geología de la región de Boca de Uchire. Mem., *V Congr. Geol. Venez.*, Caracas, Minis. Energ. y Min., Soc. Venez. Geol., 1: 449-467.

Campos, V., S. Osuna y V. Vivas, 1980. Geología del borde oriental del frente de montañas de la serranía del Interior, estados Miranda, Guárico y Anzoátegui. *Bol. Geol.*, Minis. Energ. y Min., Caracas, 14(26): 137-196.

Enviar Comentarios





[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)