

TERCIARIO (Eoceno)

Estado Zulia

Maury (1925-c) llamó "capas de Río San Pedro" a las rocas en la localidad tipo del macroforaminífero *Helicolepidina spiralis*, incluidas por Tobler (1922) en el tope de las lutitas de Paují, y consideradas hoy como parte de la Formación Mene Grande. Liddle (1946) publicó el término "Formación Río San Pedro" para designar lo que el mismo autor (1928) había llamado "Formación San Pedro", junto con calizas eocenas expuestas en Falcón.

Referencias

Liddle, R. A., 1928. *The Geology of Venezuela and Trinidad*, J. P. MacGowan, Fort Worth, Texas, 552 p.

Liddle, R. A., 1946. *The geology of Venezuela and Trinidad*, 2nd. ed., Paleont. Res. Inst., Ithaca, N. Y., p. 890.

Maury, C. J., 1925-c. Venezuelan stratigraphy. *Amer. Jour. Sci.*, 5th. ser., 9(53): 411-414.

Tobler, A., 1922. Die Jacksonstufe (Priabonien) in Venezuela und Trinidad. *Eclog. Geol. Helv.*, 17(3): 342-346.

Enviar Comentarios



1st Ed. English



Comentarios Recibidos



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)